

Characteristics of lobe reconnection obtained from IMAGE/LENA and SuperDARN observations

田口 聡[1]; 細川 敬祐[1]; 中尾 昭[1]; 山崎 敦[2]; 藤田 茂[3]; Collier Michael R. [4]; Moore Thomas E. [4]; 行松 彰[5]; 佐藤 夏雄[6]; 田中 高史[7]

Satoshi Taguchi[1]; Keisuke Hosokawa[1]; Akira Nakao[1]; Atsushi Yamazaki[2]; Shigeru Fujita[3]; Michael R. Collier[4]; Thomas E. Moore[4]; Akira Sessai Yukimatu[5]; Natsuo Sato[6]; Takashi Tanaka[7]

[1] 電通大・情報通信; [2] 東北大・理・惑星プラズマ大気; [3] 気象大; [4] NASA ゴダードスペースフライトセンター; [5] 極地研超高層(併 総研大極域科学); [6] 極地研; [7] 九大

[1] Univ. of Electro-Communications; [2] Planet. Plasma and Atmos. Res. Cent., Tohoku Univ.; [3] Meteorological College; [4] NASA GSFC; [5] UAP, NIPR (SOKENDAI, Polar Science); [6] NIPR; [7] Kyushu University

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**