

Reconstruction of two-dimensional magnetopause structures based on Cluster multi-spacecraft measurements

長谷川 洋[1]; Sonnerup Bengt U. O. [2]; Dunlop Malcolm W. [3]; Balogh Andre[4]; Georgescu Edita[5]; Haaland Stein E. [5]; Klecker Berndt [6]; Paschmann Goetz[5]; Lavraud Benoit [7]; Dandouras Iannis[7]; Reme Henri [7]; Vaivads A. [8]

Hiroshi Hasegawa[1]; Bengt U. O. Sonnerup[2]; Malcolm W. Dunlop[3]; Andre Balogh[4]; Edita Georgescu[5]; Stein E. Haaland[5]; Berndt Klecker[6]; Goetz Paschmann[5]; Benoit Lavraud[7]; Iannis Dandouras[7]; Henri Reme[7]; A. Vaivads[8]

[1] ダ - トマス大学; [2] ダ - トマス大学; [3] ラザフォ - ド・アプルトン研究所; [4] インペリアルカレッジ; [5] マックスプランクケンキュウジヨ; [6] マックスプランク研究所; [7] CESR; [8] IRF Uppsala

[1] Dartmouth College; [2] Thayer Sch. of Engineering, Dartmouth Col.; [3] Rutherford Appleton Lab.; [4] Imperial College; [5] MPE; [6] Max-Planck-Institut; [7] CESR; [8] IRF Uppsala

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**