

Some ion concentration profiles in pore water samples from gas hydrate-bearing sediments offshore Sakhalin

南 尚嗣[1]; 坂上 寛敏[2]; 八久保 晶弘[3]; 百武 欣二[3]; 阿部 清[3]; 今野 隆也[2]; Mazurenko Leonid[4]; Matveeva Tatiana[4]; 高橋 信夫[2]; Obzhirov Anatoly[5]; Soloviev Valery[4]; 庄子 仁[3]

Hirotsugu Minami[1]; Hirotohi Sakagami[2]; Akihiro Hachikubo[3]; Kinji Hyakutake[3]; Kiyoshi Abe[3]; Takaya Konno[2]; Leonid Mazurenko[4]; Tatiana Matveeva[4]; Nobuo Takahashi[2]; Anatoly Obzhirov[5]; Valery Soloviev[4]; Hitoshi Shoji[3]

[1] 北見工大・機器分析センター; [2] 北見工大・機能材料; [3] 北見工大・未利用エネルギー研究センター; [4] VNIIOkeangeologia; [5] POI, FEB RAS

[1] Instrumental Analysis Center, Kitami Institute of Technology; [2] Department of Materials Science, Kitami Institute of Technology; [3] New Energy Resources Research Center, Kitami Institute of Technology; [4] VNIIOkeangeologia; [5] POI, FEB RAS

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**