

Analysis of the low-frequency seismic modes after the Mw = 9 Sumatra earthquake using superconducting gravimeters

Rosat Severine[1]; 佐藤 忠弘[2]; 田村 良明[3]; 今西 祐一[4]; Hinderer Jacques[5]; McQueen Herbert[6]; 土井 浩一郎[7]; 渋谷 和雄[7]; 大橋 正健[8]

Severine Rosat[1]; Tadahiro Sato[2]; Yoshiaki Tamura[3]; Yuichi Imanishi[4]; Jacques Hinderer[5]; Herbert McQueen[6]; Koichiro Doi[7]; Kazuo Shibuya[7]; Masatake Ohashi[8]

[1] 天文台・水沢; [2] 国立天文台; [3] 国立天文台・水沢; [4] 東大・海洋研; [5] ストラスブルグ・地球物理; [6] ANU・地球科学; [7] 極地研; [8] 東大・宇宙線研

[1] Mizusawa, NAO; [2] NAO; [3] NAOJ, Mizusawa; [4] ORI, Univ. of Tokyo; [5] Physique du Globe, Strasbourg; [6] Earth Sciences, ANU; [7] NIPR; [8] ICRR, Tokyo univ.

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**