

Remelting of a solidified high-Mg andesite magma: a possible origin of sanukitoid

巽 好幸[1]; 川畑 博[2]; 鈴木 敏弘[3]; 宮崎 隆[4]; 常 青[1]; 佐藤 佳子[5]; 谷 健一郎[1]; 高橋 俊郎[1]; 柴田 知之[6]; 芳川 雅子[7]

Yoshiyuki Tatsumi[1]; Hiroshi Kawabata[2]; Toshihiro Suzuki[3]; Takashi Miyazaki[4]; Qing Chang[1]; Keiko Sato[5]; Kenichiro Tani[1]; Toshiro Takahashi[1]; Tomoyuki Shibata[6]; Masako Yoshikawa[7]

[1] IFREE, JAMSTEC; [2] 独立行政法人海洋研究開発機構; [3] JAMSTEC, IFREE; [4] IFREE, JAMSTEC; [5] JAMSTEC, IFREE; [6] 京大・地球熱学研究施設; [7] 京大・地球熱学研究施設

[1] IFREE, JAMSTEC; [2] JAMSTEC; [3] IFREE / JAMSTEC; [4] IFREE, JAMSTEC; [5] JAMSTEC, IFREE; [6] BGRL, Kyoto Univ; [7] BGRL, Kyoto Univ.

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**