

Flickering neutral atom fluxes in the direction of the high-altitude cusp: Simultaneous observations from IMAGE and SuperDARN

村田 洋三 [1]; 田口 聡 [2]; 細川 敬祐 [2]; 中尾 昭 [2]; Collier Michael R.[3]; Moore Thomas E.[3]; 佐藤 夏雄 [4]; 山岸 久雄 [5]; 行松 彰 [6]

Yozo Murata[1]; Satoshi Taguchi[2]; Keisuke Hosokawa[2]; Akira Nakao[2]; Michael R. Collier[3]; Thomas E. Moore[3]; Natsuo Sato[4]; Hisao Yamagishi[5]; Akira Sessai Yukimatu[6]

[1] 電通大, 菅平宇宙電波観測所; [2] 電通大・情報通信; [3] NASA ゴダードスペースフライトセンター; [4] 極地研; [5] 極地研・超高層; [6] 極地研超高層 (併 総研大極域科学)

[1] Sugadaira Space Radio Observatory

Univ. of Electro-Communications; [2] Univ. of Electro-Communications; [3] NASA GSFC; [4] NIPR; [5] Upper Atmos. Phys., Natl. Inst. Polar Res.; [6] UAP, NIPR (SOKENDAI, Polar Science)

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。