

Primary and Secondary magnetoseismic waves associated with Pi 2 magnetic pulsation

魚住 禎司 [1]; 吉川 顕正 [2]; 糸長 雅弘 [3]; 大谷 晋一 [4]; 河野 英昭 [2]; Solovyev S. I.[5]; Liou Kan[6]; Meng Ching[6]; 湯元 清文 [7]

Teiji Uozumi[1]; Akimasa Yoshikawa[2]; Masahiro Itonaga[3]; Shinichi Ohtani[4]; Hideaki Kawano[2]; S. I. Solovyev[5]; Kan Liou[6]; Ching Meng[6]; Kiyohumi Yumoto[7]

[1] 九大・宙空環境研究センター; [2] 九大・理・地球惑星; [3] 山口大・教育; [4] J H U / A P L ; [5] ロシア宇宙物理研究所; [6] JHU/APL; [7] 九大・宙空環境研究センター

[1] SERC; [2] Earth and Planetary Sci., Kyushu Univ.; [3] Edu., Yamaguchi Univ.; [4] JHU/APL; [5] Inst. of Cosmophys. Res. and Aeron., Russia; [6] JHU/APL; [7] Space Environ. Res. Center, Kyushu Univ.

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。