

バイカル湖底ガスハイドレート含有コア間隙水及びハイドレート水の化学分析 -2005-2006年調査結果-

Chemical analyses of pore- / hydrate- water samples from gas hydrate-bearing sediment cores retrieved from Lake Baikal: 2005-2006

南 尚嗣 [1]; 八久保 晶弘 [2]; Krylov Alexey[2]; 留目 裕子 [3]; 白 俊玲 [3]; 坂上 寛敏 [3]; Khlystov Oleg[4]; Zemskaya Tamara[4]; 山下 聡 [5]; 片岡 沙都紀 [5]; Grachev Mikhail[4]; 庄子 仁 [2]

Hirotsugu Minami[1]; Akihiro Hachikubo[2]; Alexey Krylov[2]; Yuko Todome[3]; Junling Bai[3]; Hirotohi Sakagami[3]; Oleg Khlystov[4]; Tamara Zemskaya[4]; Satoshi Yamashita[5]; Satsuki Kataoka[5]; Mikhail Grachev[4]; Hitoshi Shoji[2]

[1] 北見工大・機器分析センター; [2] 北見工大・未利用エネルギー研究センター; [3] 北見工大・機能材料; [4] ロシア陸水学研究所; [5] 北見工大・土木開発

[1] Instrumental Analysis Center, Kitami Institute of Technology; [2] New Energy Resources Research Center, Kitami Institute of Technology; [3] Department of Materials Science, Kitami Institute of Technology; [4] LIN, SB RAS; [5] Department of Civil Engineering, Kitami Institute of Technology

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。