

P-wave mantle tomography with a focus on the South Pacific superswell obtained from traveltime and relative traveltime data

大林 政行 [1]; 田中 聡 [2]; 吉光 淳子 [3]; 末次 大輔 [4]; 塩原 肇 [5]; 杉岡 裕子 [6]; 金沢 敏彦 [7]; 深尾 良夫 [8]; Barruol Guilhem[9]

Masayuki Obayashi[1]; Satoru Tanaka[2]; Junko Yoshimitsu[3]; Daisuke Suetsugu[4]; Hajime Shiobara[5]; Hiroko Sugioka[6]; Toshihiko Kanazawa[7]; Yoshio Fukao[8]; Guilhem Barroul[9]

[1] IFREE, JAMSTEC; [2] IFREE・JAMSTEC; [3] JAMSTEC; [4] IFREE; [5] 東大・地震研・海半球センター; [6] 海洋研究開発機構; [7] 地震研; [8] IFREE/JAMSTEC; [9] なし

[1] IFREE, JAMSTEC; [2] IFREE/JAMSTEC; [3] JAMSTEC,IFREE; [4] IFREE; [5] OHRC, ERI, Univ. Tokyo; [6] JAMSTEC; [7] ERI, Tokyo Univ; [8] IFREE/JAMSTEC; [9] Lab. Tectonophys., Univ. Montpellier II

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。