

The FIB milling of LHDAC sample for TEM, EMPA and SEM analyses

宮原 正明 [1]; 境 毅 [1]; 大谷 栄治 [2]; 小林 祐介 [3]; 鎌田 誠司 [1]; 近藤 忠 [4]; 西嶋 雅彦 [5]; 長瀬 敏郎 [6]

Masaaki Miyahara[1]; Takeshi Sakai[1]; Eiji Ohtani[2]; Yusuke Kobayashi[3]; Seiji Kamada[1]; Tadashi Kondo[4]; Masahiko Nishijima[5]; Toshiro Nagase[6]

[1] 東北大・理・地球物質科学; [2] 東北大・理・地球物質科学; [3] 東北大・理; [4] 大阪大・理; [5] 東北大・金研; [6] 東北大・総学博

[1] Inst.Mineral. Petrol.& Econ. Geol., Faculty of Sci.,Tohoku Univ; [2] Inst. Mineral, Petrol. & Econ. Geol.,Tohoku Univ; [3] Dep. Mineral. Petrol. & Econ. Geol., Tohoku Univ.; [4] Osaka Univ.; [5] IMR, Tohoku. Univ.; [6] Tohoku Univ. Muse.

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。