

Deformation, strength, cementation and ages of the sediments in the Nankai OOST zone exposed along the Shionomisaki canyon.

安間了 [1]; 小川 勇二郎 [2]; 川村 喜一郎 [3]; Moore Gregory[4]; 川上 俊介 [5]; 岩野 英樹 [6]; 檀原 徹 [7]; 佐々木 智之 [8]; 平野 聡 [9]; YK05-08 Leg2 乗船研究者 [10]

Ryo Anma[1]; Yujiro Ogawa[2]; Kiichiro Kawamura[3]; Gregory Moore[4]; Shunsuke Kawakami[5]; Hideki Iwano[6]; Tohru Danhara[7]; tomoyuki sasaki[8]; Satoshi Hirano[9]; Shipboard Scientific Party YK05-08 Leg2[10]

[1] 筑波大・生命環境; [2] 筑波大・地球進化; [3] 深田研; [4] JAMSTEC; [5] 筑波大・地球科学; [6] 京都フィッション・トラック; [7] 京都フィッション・トラック; [8] 東大 工学系 地球システム; [9] MWJ; [10] -

[1] Life-Environment, Tsukuba Univ.; [2] Earth Evolution Sciences, Univ. Tsukuba; [3] FGI; [4] JAMSTEC; [5] Geoscience, Tsukuba, Univ.; [6] Kyoto Fission-Track Co.; [7] Kyoto Fission-Track; [8] Geosys., Eng., Univ. of Tokyo; [9] MWJ; [10] -

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。