

Characteristics of SFEs observed at the dip-equator CPMN stations

山崎 洋介 [1]; 湯元 清文 [2]; 吉川 顕正 [3]; 阿部 修司 [4]; 池田 昭大 [5]; 徳永 旭将 [6]; 沼田 有司 [5]; 亘 慎一 [7]; 歌田 久司 [8]; 環太平洋地磁気観測グループ 湯元 清文 [9]

Yosuke Yamazaki[1]; Kiyohumi Yumoto[2]; Akimasa Yoshikawa[3]; Shuji Abe[4]; Akihiro Ikeda[5]; Terumasa Tokunaga[6]; Yuji Numata[5]; Shinichi Watari[7]; Hisashi Utada[8]; Yumoto Kiyohumi Circum-pan Pacific Magnetometer Network Group[9]

[1] 九大・理・宇宙電磁気学; [2] 九大・宙空環境研究センター; [3] 九大・理・地球惑星; [4] 九大・宙空センター; [5] 九大・理・地球惑星; [6] 九大・理・地球惑星; [7] 情通機構; [8] 東大・地震研; [9] -

[1] SEE, Kyushu Univ; [2] Space Environ. Res. Center, Kyushu Univ.; [3] Earth and Planetary Sci., Kyushu Univ.; [4] Space Environ. Res. Center, Kyushu Univ.; [5] Earth and Planetary Sci.,Kyushu Univ.; [6] none; [7] NICT; [8] ERI, Univ. of Tokyo; [9] -

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**