

Three-dimensional seismic velocity structure in the off-Miyagi and off-Fukushima forearc region

山本 揚二郎 [1]; 日野 亮太 [1]; 伊藤 喜宏 [1]; 鈴木 健介 [1]; 山田 知朗 [2]; 篠原 雅尚 [3]; 金沢 敏彦 [4]; 青木 元 [5]; 田中 昌之 [6]; 高波 鐵夫 [7]; 植平 賢司 [8]; 金田 義行 [9]

Yojiro Yamamoto[1]; Ryota Hino[1]; Yoshihiro Ito[1]; Kensuke Suzuki[1]; Tomoaki Yamada[2]; Masanao Shinohara[3]; Toshihiko Kanazawa[4]; Gen Aoki[5]; Masayuki Tanaka[6]; Tetsuo Takanami[7]; Kenji Uehira[8]; Yoshiyuki Kaneda[9]

[1] 東北大・理・予知セ; [2] 東大・地震研; [3] 東大・地震研; [4] 地震研; [5] 気象庁; [6] 気象庁地震津波監視課; [7] 北大院・理学研究院・地震火山センター; [8] 九大・地震火山センター; [9] 海洋機構

[1] RCPEV, Graduate School of Sci., Tohoku Univ.; [2] ERI, Univ. of Tokyo; [3] ERI, Univ. Tokyo; [4] ERI, Tokyo Univ; [5] JMA; [6] Earthquake and Tsunami Div.,JMA; [7] ISV, Hokkaido Univ; [8] SEVO, Kyushu Univ.; [9] JAMSTEC,IFREE,DONET

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。