

Carbon isotope variations in the coral skeleton depending on photosynthetic light dosage

小俣 珠乃 [1]; 鈴木 淳 [2]; 佐藤 崇範 [3]; 萩島 佳代 [4]; 能丸 恵理子 [5]; 村上 明男 [6]; 村山 昌平 [4]; 川幡 穂高 [7]; 丸山 正 [8]

Tamano Omata[1]; Atsushi Suzuki[2]; Takanori Satoh[3]; Kayo Minoshima[4]; Eriko Nomaru[5]; Akio Murakami[6]; Shohei Murayama[4]; hodaka kawahata[7]; Tadashi Maruyama[8]

[1] なし; [2] 産総研・地質情報; [3] 環境省・石垣事務所; [4] 産総研; [5] 神戸大・理; [6] 神戸大・内海域セ; [7] 東京大学大学院新領域創成科学研究科; [8] 産総研・活断層研究センター

[1] JAMSTEC; [2] GSJ/AIST; [3] Ishironc, Moen; [4] AIST; [5] Science, Kobe Univ.; [6] KURCIS; [7] GFS and ORI, U of Tokyo; [8] Active Fault Research Center, GSJ/AIST

日本語の予稿集は登録されません。
英語の予稿集をご覧ください。