

Characteristics of evapotranspiration and water balance in eastern Siberian taiga

太田 岳史 [1]; 中井 太郎 [2]; 松本 一穂 [3]; Dolman Han[4]; 服部 重昭 [5]; 檜山 哲哉 [6]; 飯島 慈裕 [7]; 兒玉 裕二 [8]; Maximov Trofim C.[9]; 矢吹 裕伯 [10]

Takeshi Ohta[1]; Taro Nakai[2]; Kazuho Matsumoto[3]; Han Dolman[4]; Shigeaki Hattori[5]; Tetsuya Hiyama[6]; Yoshihiro Iijima[7]; Yuji Kodama[8]; Trofim C. Maximov[9]; Hironori Yabuki[10]

[1] 名大・生命農学・生物圏資源; [2] JST/CREST; [3] 名大・院・生命農; [4] 蘭・自由大; [5] 名大・生命農学; [6] 名大水循環センター; [7] 地球環境観測研究センター; [8] 北大・低温研; [9] 露・科ア・凍生研; [10] 観測センター

[1] Bioagricultural Sciences, Nagoya Univ; [2] JST/CREST; [3] Grad. Bioagri. Sci., Nagoya Univ.; [4] Dept. Geo-Environ. Sci., Free Univ., The Netherlands; [5] Bioagricultural Science, Nagoya Univ.; [6] HyARC, Nagoya Univ.; [7] IORGC, JAMSTEC; [8] ILTS, HU; [9] IBPC, RAS, Russia; [10] JAMSTEC/IORGC

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。