

The stress field in the aftershock region of the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake

植平 賢司 [1]; 山田 知朗 [2]; 中東 和夫 [3]; 篠原 雅尚 [4]; 松本 聡 [1]; 松島 健 [1]; 飯尾 能久 [5]; 岡田 知己 [6]; 高橋 浩晃 [7]; 宮町 宏樹 [8]; 金沢 敏彦 [9]; 内田 和也 [1]; 清水 洋 [1]

Kenji Uehira[1]; Tomoaki Yamada[2]; Kazuo Nakahigashi[3]; Masanao Shinohara[4]; Satoshi Matsumoto[1]; Takeshi Matsushima[1]; Yoshihisa Iio[5]; Tomomi Okada[6]; Hiroaki Takahashi[7]; Hiroki Miyamachi[8]; Toshihiko Kanazawa[9]; Kazunari Uchida[1]; Hiroshi Shimizu[1]

[1] 九大・地震火山センター; [2] 東大・地震研; [3] 東大・地震研; [4] 東大・地震研; [5] 京大・防災研; [6] 東北大・理・予知セ; [7] 北大・理・地震火山センター; [8] 鹿大・理・地球環境; [9] 地震研

[1] SEVO, Kyushu Univ.; [2] ERI, Univ. of Tokyo; [3] ERI; [4] ERI, Univ. Tokyo; [5] DPRI, Kyoto Univ.; [6] RCPEV, Graduate School of Sci., Tohoku Univ.; [7] ISV, Hokkaido Univ; [8] Earth and Environmental Sci., Kagoshima Univ.; [9] ERI, Tokyo Univ

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。