

相模湾湧水域の腹足類ツブナリシャジクはヘイトウシンカイヒバリガイ（二枚貝）を頼っている

Turrid snail *Phymorhynchus buccinoides* relies on seep mussel *Bathymodiolus platifrons* in Sagami Bay

藤倉 克則 [1]; 渡部 裕美 [2]; 木下 吟 [3]; 山本 啓之 [4]; 吉田 尊雄 [2]; 奥谷 喬司 [2]; 山中 寿朗 [5]; 佐々木 猛智 [6]

Katsunori Fujikura[1]; Hiromi Watanabe[2]; Gin Kinoshita[3]; Hiroyuki Yamamoto[4]; Takao Yoshida[2]; Takashi Okutani[2]; Toshiro Yamanaka[5]; Takenori Sasaki[6]

[1] 海洋機構・生物圏; [2] なし; [3] 広大大学院; [4] 海洋機構; [5] 岡大院・自然; [6] 東大・総合研究博物館

[1] XBR, JAMSTEC; [2] JAMSTEC; [3] Biosphere Science, Hiroshima Univ.; [4] JAMSTEC; [5] Fac. Sci., Okayama Univ.; [6] Univ. Mus., Univ. Tokyo

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。