

Secular variation in composition of shallow-water carbonates on submerged seamounts in the northwestern Pacific Ocean

高柳 栄子 [1]; 井龍 康文 [2]; 尾田 太良 [3]; 佐藤 時幸 [4]; 千代延 俊 [5]; 西村 昭 [6]; 中澤 努 [7]; 塩川 智 [8]

Hideko Takayanagi[1]; Yasufumi Iryu[2]; Motoyoshi Oda[3]; Tokiyuki Sato[4]; Shun Chiyonobu[5]; Akira Nishimura[6]; Tsutomu Nakazawa[7]; Satoshi Shiokawa[8]

[1] 名大・環; [2] 名古屋大・環境・地球; [3] 東北大・院・理; [4] 秋田大・工; [5] 東北大・理・地学; [6] 産総研地質情報研究部門; [7] 産総研・地球科学; [8] 資源機構

[1] Depart. Earth & Planetary Sci., Nagoya Univ.; [2] Depart. Earth & Planetary Sci., Nagoya Univ.; [3] IGPS, Tohoku Univ.; [4] Facul. Engineering & Resource Sci., Akita Univ.; [5] Ins. Geol. & Paleontol., Tohoku Univ.; [6] Inst. Geol. and Geoinf., GSJ, AIST; [7] GSJ, AIST; [8] JOGMEC

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**