

内陸地震はリフトの再活動によって引き起こされるのか？

Can a reactivation of ancient rift systems trigger devastating intraplate earthquakes?

加藤 愛太郎 [1]; 蔵下 英司 [1]; 五十嵐 俊博 [1]; 酒井 慎一 [2]; 飯高 隆 [3]; 篠原 雅尚 [1]; 金沢 敏彦 [4]; 山田 知朗 [3]; 岩崎 貴哉 [3]; 平田 直 [1]; 2007年中越沖地震合同余震観測グループ 飯高 隆 [5]; 中川 茂樹 [6]

Aitaro Kato[1]; Eiji Kurashimo[1]; Toshihiro Igarashi[1]; Shin'ichi Sakai[2]; Takashi Iidaka[3]; Masanao Shinohara[1]; Toshihiko Kanazawa[4]; Tomoaki Yamada[3]; Takaya Iwasaki[3]; Naoshi Hirata[1]; Takashi Iidaka Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake[5]; Shigeki Nakagawa[6]

[1] 東大・地震研; [2] 東大地震研; [3] 東大・地震研; [4] 地震研; [5] -; [6] 東大地震研

[1] ERI, Univ. Tokyo; [2] E.R.I., Univ. of Tokyo; [3] ERI, Univ. of Tokyo; [4] ERI, Tokyo Univ; [5] -; [6] ERI, the Univ. of Tokyo

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。