

Characteristics of subsurface structures of the western mare regions estimated from Lunar Radar Sounder Data

押上 祥子 [1]; 山口 靖 [2]; 望月 憲悟 [3]; 渡辺 志穂 [1]; 山路 敦 [4]; 小野 高幸 [5]; 熊本 篤志 [6]; 中川 広務 [7]; 小林 敬生 [8]

Shoko Oshigami[1]; Yasushi Yamaguchi[2]; Kengo Mochizuki[3]; Shiho Watanabe[1]; Atsushi Yamaji[4]; Takayuki Ono[5]; Atsushi Kumamoto[6]; Hiromu Nakagawa[7]; Takao Kobayashi[8]

[1] 名大・環境; [2] 名大; [3] 名大・環境・地環; [4] 京大・理・地球惑星; [5] 東北大・理; [6] 東北大・理・惑星プラズマ大気; [7] 東北大・理・地球物理; [8] KIGAM

[1] Nagoya Univ.; [2] Nagoya Univ.; [3] Earth and Environmental Sciences,Nagoya Univ.; [4] Div. Earth Planet. Sci., Kyoto Univ.; [5] Department of Astronomy and Geophysics, Tohoku Univ.; [6] Planet. Plasma Atmos. Res. Cent., Tohoku Univ.; [7] Dept. of Geophysics, Tohoku Univ.; [8] KIGAM

**日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。**