

Large ultramafic body regionally serpentinized in the forearc mantle; an example from the Ust'-Belaya ophiolite, Far East Russia

町 澄秋 [1]; 石渡 明 [2]; 早坂 康隆 [3]; Ledneva Galina V.[4]; Sokolov Sergey D.[4]; Palandzhyan Suren A.[4]; Bazylev Boris A.[5]; 森下 知晃 [6]

Sumiaki Machi[1]; Akira Ishiwatari[2]; Yasutaka Hayasaka[3]; Galina V. Ledneva[4]; Sergei D. Sokolov[4]; Suren A. Palandzhyan[4]; Borys A. Bazylev[5]; Tomoaki Morishita[6]

[1] 金沢大・院・自然科学; [2] 東北大・東北アジア研; [3] 広島大・理・地球惑星; [4] ロシア科学院地質研究所・モスクワ; [5] ロシア科学院ベルナドスキー研究所; [6] 金沢大・FSO

[1] Natural Sci. & Tec., Kanazawa Univ.; [2] NE Asia Center, Tohoku Univ.; [3] Earth and Planetary Systems Sci., Hiroshima Univ; [4] Geological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow; [5] Vernadsky Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow; [6] FSO, Kanazawa Univ.

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。