

PPS002-01

会場:103

時間:5月25日 08:30-08:45

MELOS 火星探査ミッションの概要 Mars Exploration Mission MELOS: An Overview

佐藤 毅彦^{1*}, 今村 剛¹, 松岡 彩子¹, 岡田 達明¹, 宮本 英昭², 並木 則行³, 石原 吉明⁴, 橘 省吾², 山岸 明彦⁵, 久保田 孝¹
Takehiko Satoh^{1*}, Takeshi Imamura¹, Ayako Matsuoka¹, Tatsuaki Okada¹, Hideaki Miyamoto², Noriyuki Namiki³, Yoshiaki Ishihara⁴, Shogo Tachibana², Akihiko Yamagishi⁵, Takashi Kubota¹

¹ 宇宙航空研究開発機構, ² 東京大学, ³ 千葉工業大学, ⁴ 国立天文台, ⁵ 東京薬科大学

¹Japan Aerospace Exploration Agency, ²University of Tokyo, ³Chiba Institute of Technology, ⁴National Astronomical Observatory, ⁵Tokyo U of Pharmacy and Life Science

While the scientists group continues discussion on the scientific target for Japan's Mars mission, a "sure" step of exploration needs to be followed from the engineering point of view. The idea is that we will achieve an orbital insertion plus entry-descent-landing (EDL) demonstration in MELOS1 mission. The EDL module will also carry a fair amount of science payload so it is not a mere demonstrator but also a platform of scientific mission. A upscale MELOS2 mission with a well-equipped lander will follow and enhance, together with MELOS1 and future MELOSX missions, our understanding about the red planet, Mars.

Currently, there are 2 proposals for the orbiter mission. One is Martian meteorology that complements the comparative study of terrestrial planet's meteorology. Unfortunately, Akatsuki's first attempt of Venus orbital insertion (December 2010) turned out to be unsuccessful, there is a good chance of another orbital insertion a few years later. The knowledge of the Earth meteorology will be improved by Akatsuki at Venus and by MELOS1 at Mars. Another is the escaping atmosphere that is thought to be a key process of today's tenuous atmosphere of Mars. To overcome NASA's MAVEN (launch in 2013), a group of people proposes a "2 orbiter" configuration for this mission. The mission needs to be around the maximum of 25th solar cycle (~2024). The lander group proposes 4 themes: the surface environment study with a rover; the interior study through seismology and rotation measurements that benefit most from a network of ground stations; astrobiological study that focuses Martian methane and related possible metabolism; and a "flyby" sample return mission that captures the dust and the atmosphere ~40-45 km altitude while flying.

Proposed ideas are all unique and valuable for the study of Martian system that produced today's dry/cold environment of Mars. We continue evaluation of proposals in 2011 and 2012. Will decide what we will do with MELOS1 (an orbiter and an EDL demo) by fall of 2012. The mission will then be proposed for launch in early 2020's that will be a similar time frame with NASA's MSR (Mars Sample Return) Orbiter and ESA's network lander mission.

Keywords: Mars exploration, system science, orbiter, lander, evolution history, habitability

Japan Geoscience Union Meeting 2011

(May 22-27 2011 at Makuhari, Chiba, Japan)

©2011. Japan Geoscience Union. All Rights Reserved.



PPS002-02

会場:103

時間:5月25日 08:45-09:00

火星におけるダスト輸送の地域的特徴 Regional characteristics of dust haze transport on Mars

小郷原一智^{1*}, 里村雄彦²

Kazunori Ogohara^{1*}, Takehiko Satomura²

¹ 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所, ² 京都大学大学院 理学研究科

¹JAXA/ISAS, ²Kyoto University

Regions favorable (FRs) for expansion of dust storms on Mars are identified. We performed many numerical simulations where, in the northern fall ($L_s=180$), dust was injected into the atmosphere artificially from dust sources located all over the planet. Such dust transport simulations provide global maps of dust expansibility (i.e. "dust expansion potential") and show that dust expansibility differs greatly between different regions on Mars. These global maps show that dust loaded from certain areas in the northern mid-latitudes tends to spread widely within a few days. Dust injected in the vast regions around Tharsis and the Sirenum-Aonia regions also tends to spread extensively depending on local time. On the other hand, dust injected at high latitudes in either hemisphere does not spread extensively. Such global maps indicating regions favorable for dust storm expansion are a clue to understanding expansion processes and climatology of great dust storms on Mars. Moreover, none of the approach described in the presentation to understanding expansion processes and climatology of great dust storms has been taken elsewhere. In our presentation, we present results of simulations for other seasons as well as $L_s=180$ and consider concrete mechanisms of dust expansion in and around each FR.

キーワード: 火星, ダストストーム, 物質輸送, 数値シミュレーション

Keywords: Mars, dust storm, transport, numerical simulation

PPS002-03

会場:103

時間:5月25日 09:00-09:15

火星中層大気の大循環と力学

General circulation and dynamics of Martian middle atmosphere

黒田 剛史^{1*}, 火星サブミリ波サウンダ検討チーム²

Takeshi Kuroda^{1*}, Mars SMM Sounder Team²

¹ 東北大・理・地球物理, ²NICT ほか

¹Dept. of Geophysics, Tohoku Univ., ²NICT etc.

火星中層大気(高度 60 ~ 130km)の観測データは、地表面～下層大気(高度 0 ~ 60km)や上層大気・電離層(高度 130km 以上)に比べその量は圧倒的に少ない。しかしその少ない観測データや数値シミュレーションによる最近の研究によると、この高度域の大気科学が火星の気候変動や大気散逸を探る上で重要視されている。

火星大気中のダストや水蒸気は、子午面循環により南北に輸送される。火星大気大循環モデル(MGCM)による計算結果によると、その南北循環の様子は太陽からの距離や太陽直下点の変化、および地形の効果により、大きな季節変化が存在する。特に近日点に近い南半球夏季では全球的に気温は北半球夏季よりも高めとなり、よって水蒸気がより高い高度に到達し、南半球から北半球への輸送が盛んに行われると考えられている。さらに南半球夏季には年によって全球規模のダストストームが発生し、その場合ダストによる放射加熱効果がさらに南北循環を強めることができることが示唆されている。中層大気の温度場・風速場を詳しく観測できれば、これらの現象を直接的に証明することができる。

Mars Express 搭載 SPICAM による星掩蔽観測は、中層大気におけるいくつかの鉛直温度プロファイルを導出している。この観測では高度 100km 前後で大気温度はしばしば CO₂ の凝結点を下回り、それにより高度 60 ~ 100km に CO₂ 氷雲が存在することを示唆している。CO₂ 氷雲は Mars Express や Mars Odyssey に搭載されたカメラからも観測され、雲追跡による中層大気の風速の導出も行われている。中層大気の風速については、サブミリ波地上望遠鏡から見た吸収線の Doppler shift を用いた観測もある。現状の MGCM は中層大気の温度場・風速場についてこれらの観測データをうまく再現できているとは言い難く、中間圏界面(高度 80 ~ 100km)の温度は観測より 10 ~ 30K 高く、また低緯度域の東風風速は観測より小さい。このような差異が生じる要因として、下層大気から伝播する重力波の効果が考慮されていないこと、CO₂ 赤外冷却の強さに影響を及ぼす O 原子の量がうまく再現できていないことなどが示唆されている。また下層大気のダスト・水の循環や波動がはるか上の電離層に影響を及ぼすことを示唆する研究もあり、中層大気の力学・物質循環の解明が地表面から電離層までの一貫した理解につながることへの期待は大きい。

我々は MELOS 気象オービタの検討にあたり、サブミリ波サウンダによる中層大気の温度場・風速場・微量物質分布のマッピング、またカメラによる CO₂ 氷雲の撮像・追跡を通しての火星中層大気科学の解明に向けた観測を提案している。本発表ではこれまでに行われてきた火星中層大気の研究を紹介するとともに、その謎と観測計画の意義について議論する。

キーワード: 火星, 惑星大気, 大気力学, サブミリ波観測, 惑星探査, MELOS

Keywords: Mars, Planetary atmosphere, Atmospheric dynamics, Sub-millimeter observation, Space exploration, MELOS

PPS002-04

会場:103

時間:5月25日 09:15-09:30

主成分の凝結を伴う大気対流

Atmospheric convection with condensation of the major component

山下 達也^{1*}, 小高 正嗣¹, 杉山 耕一朗¹, 中島 健介², 石渡 正樹¹, 高橋 芳幸³, 西澤 誠也³, 林 祥介³
Tatsuya Yamashita^{1*}, Masatsugu Odaka¹, Ko-ichiro SUGIYAMA¹, Kensuke Nakajima², Masaki Ishiwatari¹, Yoshiyuki O.
Takahashi³, Seiya Nishizawa³, Yoshi-Yuki Hayashi³

¹ 北海道大学, ² 九州大学, ³ 神戸大学

¹Hokkaido University, ²Kyushu University, ³Kobe University

火星大気では、主成分である CO₂ が凝結する。

現在の火星では、極域に CO₂ の氷雲が存在することが知られており、これらの雲は対流によって生じている可能性がある (Colaprete et al., 2003)。

一方過去の火星では、厚い大気の下で多量の CO₂ 氷雲が存在し、その散乱温室効果が気候に大きな影響を及ぼしていたと考えられている (Forget and Pierrehumbert, 1997; Mitsuda, 2007)。

主成分が凝結する系では過飽和が生じない場合に熱力学的変数に関する自由度が 1 つ少なくなる。

自由度が減ることで、雲層における上昇域と下降域の温度プロファイルが等しくなってしまい、空気塊は浮力を得られなくなってしまう。

その為、湿潤対流は発達できないと考えられてきた。

Colaprete et al.(2003) は鉛直 1 次元モデルを用いた数値計算により、臨界飽和比 Sc_r が 1.0 を超える場合には温度分布が熱力学的平衡状態からずれられる為に、湿潤対流が生じることを示した。

しかし、鉛直 1 次元モデルでは、エントレインメントなどに関するパラメタリゼーションに不確定性が含まれている。

そこで本研究では、 $Sc_r = 1.0$ の場合の流れ場と雲の分布の特徴を掌握することを目的として、2 次元の雲対流モデルを用いた主成分凝結系の雲対流の直接数値計算を実行する。

用いるモデルは様々な惑星大気の対流構造の理解を目指して我々が開発してきたものである (小高他, 2006; Sugiyama et al., 2009;
<http://www.gfd-dennou.org/library/deepconv/>)。

モデルの基礎方程式は、準圧縮方程式 (Klemp and Wilhelmson, 1978) に主成分凝結の効果を考慮したもの (Odaka et al., 2005) である。

雲粒の落下および雲粒の荷重の効果は考慮されていない。

雲微物理過程は、Tobie et al. (2003) と同様に、雲粒の拡散成長の式を用いて定式化する。

この定式化では、蒸気から雲への変換は有限のタイムスケールで生じる。

放射過程は陽に解かず、地表面付近に水平一様加熱、対流圈に水平一様冷却を与える。

初期状態として、下層で乾燥断熱、上層で飽和蒸気圧曲線に沿う温度分布を与える。

さらに、対流を駆動するために、モデル最下層に温位のランダムノイズを与える。積分時間は 10 日である。

計算結果は、Colaprete et al. (2003) の主張とは異なり、 $Sc_r = 1.0$ の場合においても湿潤対流が生じることを示す。

準平衡状態において、CO₂ 凝結高度の下方 (乾燥域) と上方 (雲層) の鉛直運

動は連続的である。

乾燥域からの上昇流は CO₂ 凝結高度を超えて雲層上端まで達し、雲層上部からの下降流は下部境界まで達する。

上昇・下降流の最大値はともに約 15 m/sec である。

上昇する気塊は乾燥域では温度が高いために正の浮力を受け、雲層内では温度が低いために負の浮力を受ける。

下降する気塊は上昇する気塊とは逆に、雲層内では温度が高く、乾燥域では温度が低い。

雲層内の温度分布が飽和温度からずれているのは、蒸気から雲への変換に有限の時間がかかるためである。

湿潤対流が発達する理由は、上昇流に対して乾燥域で働く正の浮力が雲層内で働く負の浮力よりも十分大きいためと考えられる。

キーワード: 大気主成分の凝結, CO₂ 氷雲, 雲対流モデル

Keywords: condensation of major atmospheric component, carbon dioxide ice cloud, cloud convection model

PPS002-05

会場:103

時間:5月25日 09:30-09:45

火星メタンに関する最新の観測結果

Methane on Mars: Current observations and implication

中川 広務^{1*}, 笠羽 康正¹, 笠井 康子², 佐川 英夫²

Hiromu Nakagawa^{1*}, Yasumasa Kasaba¹, YASUKO KASAI², Hideo Sagawa²

¹ 東北大学, ² 独立行政法人通信総合研究所

¹Tohoku University, ²NICT

Since the simplest organic molecule, methane (CH₄), was detected in the Martian atmosphere in 2004, this topic has caused a big interest in the solar system, because its discovery indicates the planet is either biologically or geologically active. Up to now, ground-based and space-born observations have confirmed its presence in the Martian atmosphere (Formisano et al., 2004; Krasnopolsky et al., 2004; Geminale et al., 2008; Mumma et al., 2009; Fonti and Marzo, 2010). However, its reservoirs, release mechanisms, circulation, and sink are still open questions. The high-spectral resolution observation from ground-based telescope indicated that CH₄ showed time variation, and non-uniform distribution, with plume-like features at discrete regions (Mumma et al., 2009). Using the Planetary Fourier Spectrometer (PFS) onboard Mars Express (MEX), Geminale et al. (2011) also reported maps of non-uniformed CH₄ distribution. Although the MEX/PFS and the ground-based observations were generally not collected at the same time nor did they cover identical areas of Mars, the characteristics of the observed CH₄ fields appear to be significantly different. In contrast, photochemistry as currently understood does not produce measurable variations in CH₄ concentrations [Lefevre et al., 2009]. Lefevre et al. (2009) suggested an atmospheric lifetime of less than 200 days is necessary to reproduce the local CH₄ enhancements similar to those recently reported, which implies an unidentified CH₄ loss process that is 600 times faster than predicted by standard photochemistry. In summary, current photochemical models cannot explain the observed presence of CH₄ in the atmosphere of Mars and its reported rapid variations in space and time. The origin and sink of CH₄ on Mars remains a puzzle. In the near future, the observations using heterodyne spectroscopy with an alternative CH₄ band near 7.8 um [Sonnabend et al., 2008] are begun to monitor CH₄ from the ground, and the tunable laser spectrometer measurements is carried out at the Martian surface on the 2011 Mars Science Laboratory (MSL) to identify the isotope of CH₄ [Webstar et al., 2011]. Joint orbiter mission being considered by ESA and NASA (JIDT) is also expected to provide the significant scientific progress on this issue by investigating the nature of the trace gas with measurements of temperature and aerosols (Zurek et al., 2011). Here we review the current observations of Martian CH₄ and their implications.

キーワード: 火星, メタン, 生命, 居住適性

Keywords: Mars, Methane, Life, Habitability

PPS002-06

会場:103

時間:5月25日 09:45-10:00

MEX/PFSによる火星大気中H₂O₂の導出 Search of H₂O₂ in the Martian atmosphere by MEX/PFS

青木 翔平^{1*}, 笠羽 康正¹, マルコ ジュランナ², アンナ ジェミネル², ジュゼッペ シンドニ², 中川 広務¹, 村田 功¹, ヴィットリオ フォルミサーノ²

Shohei Aoki^{1*}, Yasumasa Kasaba¹, Marco Giuranna², Anna Geminale², Giuseppe Sindoni², Hiromu Nakagawa¹, Isao Murata¹, Vittorio Formisano²

¹ 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻, ² 伊国立宇宙物理機構・惑星間空間物理研究所

¹ Dep. Geophysics, Tohoku University, ²I.F.S.I, INAF, Italy

Recently, a small amount of CH₄ was discovered in the Martian atmosphere. This discovery is remarkable because its sources are potentially biological or geological actives. However, its source, circulation and sink are still open questions. Recent observations showed the temporal and spatial variation of CH₄, which requires fast loss, which might indicate strong oxidants. H₂O₂ would be the best tracer for the amount of possible oxidants in the Martian atmosphere. However, past ground-based and space-born observations were very limited. Thus, the temporal and spatial variations of H₂O₂ have not been understood yet.

H₂O₂ has not detected from a Martian orbiter because it required high-spectral resolution in order to distinguish between weak absorption lines of H₂O₂ (~0.1% of the background radiance) and stronger absorptions by H₂O. At the moment, the Planetary Fourier Spectrometer (PFS) onboard Mars Express (MEX) is the best instrument for this objective, which has been successfully operated for seven years. It possesses the highest spectral resolution in the mid-IR range (~1.3 cm⁻¹) in previous orbiters. However, even this resolution could not completely separate H₂O₂ from H₂O. We need careful treatment in the analysis.

In our study, we select the wavelength range from 360 to 385 cm⁻¹ where the contamination of H₂O₂ by H₂O is minimum. And, the sensitive calibration was performed: (1) FFT with the Hamming apodization, (2) characterization of a weak instrumental noise, and (3) careful averaging several thousands of measurements. In order to retrieve the mixing ratio of H₂O₂, the radiative transfer model for the Martian atmosphere has also been developed. By the comparison of the observed spectra with the model, we succeeded to determine the mixing ratio of Martian H₂O₂ with the accuracy of several tens ppb. By this method, (1) total average, (2) annual variation, and (3) seasonal variation of the H₂O₂ mixing ratio was obtained with the data observed 3 Martian years (Jan. 2004 - Dec. 2009). The main results are summarized as follows.

(1) Total average: Total averaged H₂O₂ mixing ratios have been successfully determined to be 45 +- 21 ppb in the forward pendulum direction, and 25 +- 18 ppb in the reverse pendulum direction, respectively.

(2) Annual variation: The annual mean amount of H₂O₂ in the three Martian years (MY 27, 28, and 29) was investigated. The mixing ratios of H₂O₂ were 50 +- 27 ppb and 43 +- 26 ppb at the MY 27, 0 - 89 ppb and 0 - 74 ppb at the MY 28 (upper limits), and 46 +- 21 ppb and 28 +- 20 ppb at the MY 29, respectively

(3) Seasonal variation: It shows the variation from 0 to 120 ppb during the observational period, with an average of 39 +- 16 ppb in total data set.

In all results of (1)-(3), derived amount of H₂O₂ is slightly larger than that predicted by the photochemical models and past observations. This discrepancy would be due to (1) the bias of data selection; the high Martian temperature (only 250-270K)> and the local time (only 10-16), and/or (2) the contribution of large but short enhancement in long-term average. In addition, it was noticed that the observational variations of CH₄ reported by previous works would not be explained by the process of photochemical loss even with our results.

キーワード: 火星, 大気, 赤外分光, メタン, 過酸化水素, 酸化

Keywords: Mars, Atmosphere, Infrared spectroscopy, Methane, Oxidation, Hydrogen peroxide

PPS002-07

会場:103

時間:5月25日 10:00-10:15

火星の気象測器開発

Development of Martian meteorological Instruments

乙部 直人^{1*}, はしもと じょーじ², 小郷原 一智³, 高橋 芳幸⁴, 林 祥介⁵, 竹見 哲也⁶, 玉川 一郎⁷, 鈴木 瞳³, MELOS 着陸機気象観測検討グループ⁸

Naohito Otobe^{1*}, George L. Hashimoto², Kazunori Ogohara³, Yoshiyuki O. Takahashi⁴, YoshiYuki Hayashi⁵, Tetsuya Takemi⁶, Ichiro Tamagawa⁷, Mutsumi Suzuki³, MELOS Lander Met. Working Group⁸

¹ 福岡大学理学部, ² 岡山大学自然, ³ 宇宙科学研究所, ⁴ 惑星科学研究センター, ⁵ 神戸大学理学部, ⁶ 京都大学防災研究所,

⁷ 岐阜大学流域圈科学研究センター, ⁸ MELOS 着陸機気象観測検討グループ

¹Fukuoka Univ. Dept of Sci., ²Okayama Univ. grad school of Natural Sci, ³ISAS/JAXA, ⁴Center For Planetary Science, ⁵Kobe Univ. Dept of Sci., ⁶Kyoto Univ. DPRI, ⁷Gifu Univ. River Basin Res. Center, ⁸MELOS Lander Met. Working Group

We are developing weather observation instruments install on the lander of Mars of MELOS.

At now, there are some observation on Mars, but all observation are made with basic instruments.

Then, we are examining two kinds of instruments at the same time.

One of that is a set of basic instruments, the thermometer made of thermocouple or so, the manometer, these are always used for radiosonde. And a hot-film (similar to hot-wire) anemometer, this type is boarded on Viking.

The other instruments are mainly sonic anemometer, it improve high accuracy and high frequency in low electrical power.

Mars has a very low pressure of CO₂ atmosphere, sonic wave damping is very strong, so development has a difficulty.

However some reports say it will be possible, and we are examining a possibility, we report mainly around the progress of this possibility test.

キーワード: 火星, 気象, 風速計, ランダー, MELOS

Keywords: Mars, Meteorology, anemometer, Lander, MELOS

PPS002-08

会場:103

時間:5月25日 10:15-10:30

火星周回探査機搭載用サブミリ波サウンダ FIRE の開発状況 II FIRE: Submillimeter sounder for the Maratian atmospheric observations

笠井 康子^{1*}, 火星サブミリ波サウンダ検討チーム¹
YASUKO KASAI^{1*}, MILOS sub-mm sounder team¹

¹ 情報通信研究機構

¹NICT

This paper describes the development status of a submillimeter atmospheric emission sounder FIRE which is proposed as an onboard payload of the Japanese Mars meteorological orbiter MELOS.

The submillimeter wavelength has potential advantages for the atmospheric remote sensing as there exist a large number of roto-vibrational transitions of many photochemically important species in the Martian atmosphere such as H₂O, H₂O₂, HO₂, CO, O₂, O₃ and SO₂. The vertical profiles of the atmospheric state (e.g., temperature, chemical compositions) can be retrieved by using the pressure dependency of the spectral line shape of those rotational transitions. Furthermore, thanks to high frequency resolution of the heterodyne technique, direct measurements of wind speed are realized through observing the Doppler shift of the molecular spectrum. Last but not least, the submillimeter observation is independent of dust opacity and local time. All these characteristics make the submillimeter instrument unique, and will provide a substantial progress on the Martian meteorological understanding.

We present the results of the measurement sensitivity study with respect to the key physical parameters such as H₂O, temperature, HDO/H₂O, and line-of-sight wind velocity, with assuming realistic instrumental parameters.

キーワード: Mars, sub-mm sounder

Keywords: Mars, sub-mm sounder

PPS002-09

会場:103

時間:5月25日 10:45-11:30

Exploring the Martian Surface: Lessons Learned from Thirteen Rover-Years on Mars Exploring the Martian Surface: Lessons Learned from Thirteen Rover-Years on Mars

Squyers Steven^{1*}
Steven Squyers^{1*}

¹Cornell University, Astronomy Department

¹Cornell University, Astronomy Department

The two Mars Exploration Rovers, Spirit and Opportunity, touched down on Mars in January 2004 and have been conducting extensive observations with the Athena science payload. Together the two rovers have traversed about 35 km. Spirit, located on the floor of Gusev crater, has investigated basaltic plains, as well as older materials in the Columbia Hills. The rocks of the Columbia Hills are granular in nature and have undergone significant alteration by water. They appear to be largely a mixture of altered impact ejecta and explosive volcanic materials. Spirit has discovered silica-rich deposits that may have formed in a hot spring or volcanic fumarole environment, as well as massive carbonate-rich rocks. Opportunity has carried out the first outcrop-scale investigation of ancient sedimentary rocks on Mars. The rocks are sandstones formed by wind and water erosion and re-deposition of "dirty evaporite" materials rich in sulfate salts. The stratigraphic section observed to date is dominated by wind-blown bedforms, with water-formed current ripples exposed locally near the top of the section. While liquid water was present at Meridiani below and occasionally at the surface, the ancient environmental conditions recorded there are dominantly arid, acidic and oxidizing, and would have posed some significant challenges to life.

In carrying out the rovers' mission, many lessons have been learned regarding the operation of robotic vehicles on the surface of Mars. These cover topics including flight system and mission design, traverse planning, science payload selection, flight software and autonomy, and team selection and training. Among the most important flight system capabilities are mobility, particularly in steep and rugged terrain, and a power system design that allows long mission life. Traverse planning benefits greatly from high resolution orbital imaging, and should take full advantage of topographic features, like impact craters, that provide access to important geologic materials. Important payload elements include instruments that can detect subtle compositional differences both remotely and in situ, and tools for getting below rock and soil surfaces. The most important flight software capabilities are ones that save time on the martian surface. Similarly, it is important to invest in the tools and team training necessary to minimize the duration of the uplink planning process.

Keywords: Mars Exploration Rover, Spirit, Opportunity, Operation, Science, Engineering

PPS002-10

会場:103

時間:5月25日 11:30-11:45

火星における流動地形と水の関係

Possibly water-related active features on Mars: Their climatic and biological implications

宮本 英昭^{1*}

Hideaki Miyamoto^{1*}

¹ 東京大学総合研究博物館

¹University Museum, University of Tokyo

Currently active features on Mars include numerous flow-like features identified mostly in higher latitude areas. Although liquid water has long been considered impossible to stably exist under the current climate condition, origins of some flow-like features are proposed to be related to liquid water based on their morphologies and remaining chemical compositions. Because the presence of water ice in shallow subsurface and water vapor are known to exist on Mars, water-related active processes might be a part of the story of long-lasting slow circulations of water on the surface of Mars, which might be an intriguing target for synergistic observations between the orbiter and the rander of the future MELOS mission to Mars.

The rander group of the MELOS mission is actively discussing its mission concepts, which include a biological aspect. One of the biggest goals proposed is to critically discuss if certain types of bacteria are still alive on Mars. A tentative scenario drawn for this purpose is to explore source areas of putative discharge of Methane, which may include mud volcano-like features widely spread western side of Elysium. In this talk, I will review current understanding of the flow-like features as well as other features indicative of the previous presence of liquid at a little deeper depth, such as mud volcanoes, and discuss their implications to the mission concept of the MELOS mission.

キーワード: 火星複合探査, M E L O S , 火星, 水, 周氷河地形

Keywords: Mars exploration, MELOS, Mars, water, periglacial area

PPS002-11

会場:103

時間:5月25日 11:45-12:00

Sulphate-rich bedrocks at Meridiani Planum, Mars: Constraints and modelling Sulphate-rich bedrocks at Meridiani Planum, Mars: Constraints and modelling

Erwan TREGUIER^{1*}, Gilles Berger², Mike Toplis², Patrick Pinet², Lionel D'Uston², Patrick Martin¹
Erwan TREGUIER^{1*}, Gilles Berger², Mike Toplis², Patrick Pinet², Lionel D'Uston², Patrick Martin¹

¹ESA/ESAC, Villanueva de la Canada, Spain, ²OMP, Toulouse, France

¹ESA/ESAC, Villanueva de la Canada, Spain, ²OMP, Toulouse, France

The sulphur-rich nature of Martian soils is known since the Viking missions [1]. Data from recent orbital and landed missions have confirmed the important role played by the sulphur cycle on Mars [2] by showing that sulphates were among the most abundant secondary minerals on the Martian surface. Understanding which geological processes led to their formation is of particular interest as it may yield important clues about the presence of water during Mars' geological history. In this context, data from the Mars Exploration Rover (MER) Opportunity provide crucial constraints on the conditions prevailing during the formation of Meridiani Planum sulphate-rich bedrocks. Terrains visited by Opportunity at Meridiani appear to be sulphur-rich (up to 25 % SO₃) layered rocks covered by basaltic soils [3]. Outcrops are exposed by impact craters, allowing their analysis by the rover's instruments. Another notable feature of these plains is the ubiquitous presence of mm-sized spherules, containing hematite, observed in both the rocks and the soils. Some mafic constituents are also present in the rocks.

In addition to hypotheses formulated before the beginning of on-site observations, such as subaqueous sedimentary deposition [4], various formation scenarios have been proposed (or significantly refined) since the landing of the rover: impact surge [5], weathering of dust-ice deposits [6], alluvial deposition of exogenous materials [7], groundwater diagenesis of evaporitic sandstones [3,8], volcanic processes [9], and alteration of basaltic material through sulphur-bearing fluids [10,11]. It is worth to note that these models are not necessarily all mutually exclusive. Numerous constraints exist as regards these hypotheses, relative to the chemical/mineralogical compositions (including variations within the investigated layers), the provenance of the constituents involved in the formation scenario (including water, if needed), the textural observations, etc. The large-scale geological context, known from orbital data, has also to be taken into consideration [12], especially as the rock layers investigated by Opportunity only represent a small part of the full stratigraphic sequence of sulphate-bearing layers at Meridiani.

All the proposed scenarios have their own advantages and issues. The model of alteration of basaltic material through cold sulphur-bearing fluids [10,11], using a geochemical numerical simulator, provides particularly interesting results. Here, acidic fluids are assumed to originate from volcanic sour gas dissolution into pure water and the main parameter of the model is the quantity of added sulphur, expressed in terms of SO₃/basalt mass ratio. The role of brine circulation is also taken into account. A good match with MER observations at Meridiani is obtained for a particular adjustment of the model parameters suggesting an alteration occurring in highly acidic brines and involving small amounts of water over a short period of time (or in an intermittent way). Additionally, the potential mineralogies obtained through this model over a wider range of initial conditions could also explain compositions encountered in other Martian regions.

References: [1] Clark et al. (1982), JGR, vol. 87. [2] King & McLennan (2010), Elements, vol. 6. [3] Squyres et al. (2004), Science, vol. 306. [4] Edgett & Parker (1997), GRL, vol. 24. [5] Knauth et al. (2005), Nature, vol. 438. [6] Niles & Michalski (2009), Nat. Geosc., vol. 438. [7] Fan et al. (2008), GRL, vol. 35. [8] McLennan et al. (2005), EPSL, vol. 240. [9] McCollom & Hynek (2005), Nature, vol. 438. [10] Treguier et al. (2008), JGR, vol. 113. [11] Berger et al. (2009), Am. Min., vol. 94. [12] Hynek & Phillips (2008), EPSL, vol. 274.

キーワード: Mars, Meridiani, alteration, sulfuric acid, Mars Exploration Rover, geochemical modelling
Keywords: Mars, Meridiani, alteration, sulfuric acid, Mars Exploration Rover, geochemical modelling

PPS002-12

会場:103

時間:5月25日 12:00-12:15

火星隕石の多様性と火星探査によって得られたりモートセンシングデータとの関係 Diversity of Martian meteorites and its relationship to the remote sensing data as obtained by Mars exploration

三河内 岳^{1*}

Takashi Mikouchi^{1*}

¹ 東大・理・地球惑星科学

¹Dept. Earth & Planet. Sci., U. of Tokyo

Recent recoveries of many hot and cold desert meteorites have drastically increased the number of Martian meteorites. We only had 10 samples in early 1990s, but now we have more than 50 unpaired samples. At the same time, the accumulation of remote sensing data by Mars mission has been considerably increasing for the past 15 years. Therefore, now is a good time to compare Martian meteorites and remote sensing data to construct the better view of the red planet.

In spite of the increase of recovered Martian meteorites, classic grouping as "SNC" (shergottite-nakhelite-chassignite) meteorites is still alive probably because many samples were transported to the earth by the same ejection event. Except for ALH84001, all other samples can be grouped as either of "SNC" with young crystallization ages (170-1300 Ma). Therefore, these samples probably originated from Tharsis or Elysium regions. It is still unexplained why ALH84001 is the only old sample possibly originating from the southern hemisphere. All Martian meteorites are igneous rocks, and no sedimentary rocks have been found yet, although both orbiters and rovers have found the wide distribution of sedimentary rocks. One of the explanations is that these altered rocks can not be ejected into the space because of fragile nature of the rock.

Shergottite is still the largest group of Martian meteorites that are generally divided into three subgroups (basaltic, lherzolitic, and olivine-phyric) based on petrology and mineralogy. In recent years, geochemical studies have shown that shergottites can be divided into another three subgroups (enriched, depleted, and intermediate) based on distinct trace element and isotopic compositions, which is completely independent from petrological subgrouping. Their redox states are closely related to these geochemical characteristics, and interpreted to reflect the heterogeneity of the mantle reservoirs [e.g., 1]. These reservoirs formed about 4.5 Ga in a global magma ocean and kept separated because of the absence of active plate tectonics since the reservoirs formed. The second largest group is nakhelite that now consists of 8 samples. Because all nakhlites show similar mineralogy and ages, they probably originated from the same igneous body on Mars with possible layering by accumulation of crystallizing minerals. Each nakhelite is modeled to fit the location from near the surface to the depth of this igneous body. Nakhlites show minor evidence for secondary aqueous alteration that is related to the burial depth as inferred from igneous accumulation. There are a few alteration phases, but the presence of jarosite is important because it is one of the major alteration products on the surface as discovered by Mars Exploration Rover. Two chassignites are dunite rocks that have identical ages to nakhlites. The second chassignite shows black appearance because of the presence of Fe-rich nano-particles in olivine formed by shock metamorphism. ALH84001 is the only old Martian meteorite and the presence of possible biogenic magnetite is still under dispute.

Thus, Martian meteorites are important sources to deduce differentiation history of the planet. However, caution should be taken when we discuss a global view of the planet because of their young formation ages [2]. In fact, the chemical composition of the surface obtained by orbiters showed that the majority is tholeiitic basalts and Martian meteorites have distinct chemical compositions. Obviously Martian meteorites do not represent old crustal chemistry although they record that the planet's interior preserves distinctive regions that formed at 4.5 Ga.

References: [1] Borg L. E. et al. (2003) GCA 67, 3519-3536. [2] McSween H. Y. Jr. (2009) Science 324, 736-739.

キーワード: 火星隕石, 火星探査

Keywords: martian meteorites, mars exploration

PPS002-13

会場:103

時間:5月25日 12:15-12:30

MELOS 火星着陸探査システムの検討 Mars Landing System for Surface Science in MELOS Mission

岡田 達明^{1*}, 久保田 孝¹, 藤田 和央¹, 尾川 順子¹, 並木 則行², 石原 吉明³, 佐藤 毅彦¹, MELOS WG¹, Tatsuaki Okada^{1*}, Takashi Kubota¹, Kazuhiro Fujita¹, Naoko Ogawa¹, Noriyuki Namiki², Yoshiaki Ishihara³, Takehiko Satoh¹, MELOS WG¹

¹ 宇宙航空研究開発機構, ² 千葉工業大学 惑星探査研究センター, ³ 国立天文台

¹JAXA, ²PERC, Chiba Institute of Technology, ³NAOJ

Mars landing exploration system is being studied in MELOS, a Japanese Mars mission under study, including deployment from orbiter, entry into martian atmosphere, descending with aerodynamical control by heat shield, followed by parashute deceleration, landing with hazard avoidance, navigation and control, deployment of rover, and long-term operation on the Mars. Landing system and the following scientific observation as a long-lived station. Such landing and surface exloration system is briefly reported in this presentation.

Mars is among the extremely attractive planets to be explored in its nature: inner structure, surface processes, weather and climate system, and atmospheric escape. Furthermore, there are planned a sample return of dusts floating in the air and an exploration of life in the habitable zone showing aquifer or methane gas. In the MELOS mission, all of these aspects are studied and some of them will be selected as a united Mars mission to be proposed as a MELOS series.

Entry, descent and landing (EDL) as well as surface long-lived technology and surface rover technology are yet to be developed in Japan but essential for the missions of inner structure, surface processes, and life on Mars. Thus the EDL of a probe from Mars orbiter and the surface long-lived technology on the Mars are investigated in this study to clarify the technical problems and estimate the feasibility.

Three kinds of entry probes are assumed: A) a 700kg class probe to land a 500kg class lander with a 100kg class rover with 20 to 25 kg science payloads carried. B) two 350kg class probes to land 300kg class lander with 20 to 25 kg science payloads. C) 450kg and 250kg probes to land a 400kg and a 200kg landers, with 30kg class rover on the large one, and with 20 to 25 kg science payloads.

To start this study, we assumed that the launcher is H-2A-204, with 1.8t wet mass of the orbiter and landing system. The orbit of the orbiter is 300km x 10 Mars radius. The probe should survive during cruise using a internal heater.

The lander is a legged lander with aerodynamically decrease by heat shield and parashute, and controls its attitude for soft and smart landing by RCS (Reaction Control system) and reaction wheel (RW). The lander is expected to survive in the winter season for a long-lived station to investigate inner structure.

The lander instruments include seismometry, mass spectrometer, X-ray analyzer, landscape and macro imagers, magnetometer, space VLBI, meteorological package, atmospheric radio sounding in 25 kg. Rover is mounted on the lander. Communication system has X-band for direct link to the terrestrial station and UHF band for link to the orbiter. Battery and solar paddle for energy and thermal control are prepared for survivability even in the winter.

The feasibility of such EDL and long-lived technology has been examined to find a solution for a mission success as well as low cost in the spacecraft system.

キーワード: 火星, 着陸, 地質探査, 内部構造, 大気観測, ローバ

Keywords: Mars, Landing, Geological Survey, Inner structure, Atmosphere Observation, Rover

PPS002-14

会場:103

時間:5月25日 12:30-12:45

MELOS 生命探査: 火星表面における微生物(メタン酸化菌)探査 MELOS Life Search plan: Search for microbes on the surface of Mars

山岸 明彦^{1*}, 吉村 義隆², 宮川 厚夫³, 本多 元⁴, 小林 憲正⁵, 長沼 毅⁶, 三田 肇⁷, 佐々木 晶⁸, 宮本 英明⁹, MELOS 生命探査グループ¹

Akihiko Yamagishi^{1*}, Yoshitaka Yoshimura², Atsuo Miyakawa³, Hajime Honda⁴, Kensei Kobayashi⁵, Takeshi Naganuma⁶, Hajime Mita⁷, Sho Sasaki⁸, Hideaki Miyamoto⁹, MELOS Life Search Subgroup¹

¹ 東京薬科大学 生命科学部, ² 玉川大学, ³ 静岡大学, ⁴ 長岡技術科学大学, ⁵ 横浜国大, ⁶ 広島大学, ⁷ 岡工業大学, ⁸ 国立天文台, ⁹ 東京大学

¹Tokyo Univ. Pharm. Life Scie., ²Tamagawa Univ., ³Shizuoka Univ., ⁴Nagaoka University of Technology., ⁵Yokohama National Univ., ⁶Hiroshima Univ., ⁷Fukuoka Inst. Tech., ⁸RISE Project, NAOJ, ⁹The Univ. Tokyo

生命には水が必須である。もう一つ生命の維持に重要な因子としてギブス自由エネルギーがある。動物は食物と酸素無しには生存できないが、それは両者が自由エネルギーの獲得に必要だからである。火星で生命が誕生して現在もまだ生存し続けているとするならば、今まで自由エネルギーが入手可能な場所でなければならない。

生物による自由エネルギー獲得方法としては、呼吸（動物）、光合成（植物）、化学合成（化学合成微生物）の三つが知られている。火星におけるメタンの発見と、地球におけるメタン酸化鉄還元細菌の発見（Beal ら 2009）から、我々は火星表面において現在もまだメタン酸化鉄還元細菌（化学合成微生物の一種）が生存しうるのではないかと推定するに至った。

もし、火星に於いて生命が誕生し現在も生存しているとすれば、そこは生存にとって困難な条件をさける環境でなければならぬ。火星の様々な環境の内で温度、気圧、重力等は地球の生命を考えた場合には十分に生存可能な環境である。放射線も生死に影響を与えるほどの強度は持っていない。唯一、紫外線が重要な致死要因となる。しかし、紫外線は様々な物質によって吸収されるので、薄い火星土壤に覆われるだけで、十分生育可能な環境となる。細胞内の液体の水は地球型生命にとって必須であるが、細胞外の液体の水は生存にとっては必須ではない。従って、メタンと酸化鉄のような酸化型物質の両者がある場所であれば、数センチメートル程度の深さでも微生物は生存している可能性があると推定している。

微生物探査の方法としては、蛍光色素をもちいた蛍光顕微鏡観察を自動的に行う。これまで多くの蛍光色素が開発されている。その中から、生命の定義に対応した色素を組み合わせて用いる。細胞の内外を区別する膜（境界）の存在を識別する色素、細胞の複製にひつような遺伝物質を識別する色素、細胞の代謝を司る酵素の存在を識別する色素を組み合わせて用いる。これらの色素の組み合わせから、「細胞」の特徴を抽出することができる。

さらに、その後「細胞」らしき粒子のアミノ酸分析を行う。地球の生物はすべて20種類のL型アミノ酸からなるタンパク質を持っている。火星の「細胞」らしき粒子が地球と同じアミノ酸かどうかを調べる事により、「細胞」の由来を知ることができる。その他、現在検討中の探査方法について報告する。

キーワード: 火星表面, 生命探査, 微生物, メタン酸化菌, 蛍光顕微鏡

Keywords: Surface of Mars, Life search, microbe, methane oxidizing bacteria, fluorescence microscope

PPS002-15

会場:103

時間:5月25日 14:15-14:30

火星の内部構造の解明に向けて What we have learned about the internal structure of Mars

千秋 博紀^{1*}
Hiroki Senshu^{1*}

¹ 千葉工業大学惑星探査研究センター

¹PERC/Chitech

Mars has long been a target of exploration missions. Now we know the size and mass of Mars, that Mars has rarefied atmosphere and seasons, that Mars has obvious north-south dichotomy, and that Mars has the largest volcano in the solar system at the equator region. Then, what have we learned about internal structure of Mars?

The bulk density of Mars means that there is a dense core at the center of Mars. On the other hand Mars does not show intrinsic magnetic field, which means no vigorous convection in the core. According to the observation of gravity and topography the crustal structure of Mars shows contiguous thickening from north to south, which means long wave length mantle dynamics. The large volcanoes should have been supported by superplume.

In this talk, I will review what we have learned about the internal structure and thermal evolution model of Mars, and discuss what should be observed next to unveil the interior and history of Mars.

Keywords: Mars, internal structure, thermal evolution, mantle dynamics

PPS002-16

会場:103

時間:5月25日 14:30-14:45

Numerical models of Martian mantle evolution induced by magmatism and solid-state convection

Numerical models of Martian mantle evolution induced by magmatism and solid-state convection

柳澤 孝寿^{1*}, 小河 正基²

Takatoshi Yanagisawa^{1*}, Masaki Ogawa²

¹ 海洋研究開発機構地球内部ダイナミクス領域, ² 東京大学大学院総合文化研究科

¹IFREE, JAMSTEC, ²School of Arts & Sciences, Univ. Tokyo

To consider the thermo-chemical evolution of Martian mantle, various studies have been performed, but most of them are based on parameterized convection models. Hence, they needed strong assumptions about the process of the evolution. Here we present numerical models of mantle evolution including magmatism in 2-D convecting mantle. By including magmatism, our models can reproduce compositionally layered mantle structure and surface crust spontaneously, and can treat the whole evolution process consistently. The viscosity is strongly temperature-dependent, and the lithosphere is stagnant. Magmatism is modeled as a permeable flow of basaltic magma generated by decompression melting. The effect of partitioning of heat producing elements into the melt is also included. When the initial mantle temperature is sufficiently high, a reminiscence of magma ocean develops to generate a thick basaltic crust and make the mantle compositionally layered. The upper layer consists of compositionally buoyant residue of the basaltic crust, while the lower layer consists of compositionally denser materials not depleted in the basaltic component. Hot plumes grow from the lower layer and make it thinner with time by erosion. The plume magmatism also keeps the mantle temperature below the solidus by efficiently extracting heat as soon as the mantle temperature exceeds the solidus. When the mantle is initially not so hot as to develop a sizable magma ocean, the compositional layering becomes milder, and a broad lateral heterogeneity temporally develops in deep mantle depending on the viscosity of the lithosphere. Martian mantle is likely to have evolved as a relaxation from a compositionally layered state formed by magma ocean, and plume magmatism probably has played a crucial role in the relaxation process.

Keywords: Mars, mantle evolution, magmatism, basaltic crust

PPS002-17

会場:103

時間:5月25日 14:45-15:00

宇宙測地学的手法による火星回転変動計測

Measurements of Martian rotational variations by space geodetic techniques

岩田 隆浩^{1*}, 松本 晃治², 石原 吉明², 菊池 冬彦², 原田 雄司³, 佐々木 晶²

Takahiro Iwata^{1*}, Koji Matsumoto², Yoshiaki Ishihara², Fuyuhiko Kikuchi², Yuji Harada³, Sho Sasaki²

¹JAXA 宇宙科学研究所, ² 国立天文台, ³ 上海天文台

¹ISAS/JAXA, ²NAOJ, ³Shanghai Astronomical Observatory

一般に固体天体の表層環境の変化や内部構造は、その天体の回転（自転）変動に影響を及ぼし、その変動の振幅や位相は電波航法や VLBI などの宇宙測地学的手法により観測可能である。特に火星は、地球と類似の構成要素を有しながらも、過去から現在に至る進化やダイナミクスの様相は大いに異なっており、その相違を表層環境・内部構造から解き明かすことは比較惑星学的に重要である。

火星の回転変動は、従来は着陸機（ランダー）の追跡データ（2ウェイ測距・距離変化率計測：RARRなど）を利用して計測されており、例えば Viking 1 および 2, Mars Pathfinder によって、歳差や自転速度変動が得られてきた。これらの計測手法には、地球・火星間の経路上および地上局の位相安定度等に起因すると考えられる測定精度の限界がある。そこで欧州の研究グループは、周回探査機（オービター）とランダー間の RARR を利用した電波航法による精度向上を提案しているが、現時点で採択には至っていない。

一方我が国では、オービターとランダー等の複数探査機を用いた火星複合探査（MELOS: Mars Exploration with Lander-Orbiter Synergy）の検討が開始された。そこで我々は、4ウェイドプラ計測（FWD）、逆 VLBI（iVLBI）等の新たな測地学的手法による、火星回転変動の高精度計測を提案する。4ウェイドプラ計測（FWD）は、宇宙機の位置・軌道を中心機を経由した4経路から決定する測地手法であり、我々は月周回衛星「かぐや」での月裏側の重力場観測という実績を有している。MELOS 計画では、宇宙機の構成は未定であるが、オービターとランダーという構成が一案である。この時、追跡局 オービター ランダー オービター 追跡局の経路でドプラ計測（距離変化率計測）を実施する。同時に、点線で示す経路で、オービターとランダーの 2ウェイ RARR を実施する。本方式で期待される測定精度は従来の電波航法より向上し、オービター・ランダー間 RARR を利用した場合の精度に相当すると推定される。逆 VLBI（iVLBI）は、複数の宇宙機からの同期した信号の位相比較を行って、各々の相対位置を測定する手法であり、測定精度は周波数の逆数に比例し、地上と対象宇宙機の距離に依存しないで高精度で決定できるという特徴を持つ[1]。MELOS 計画では、ランダーから地上への直接送信波と、オービターでコヒーレントに中継された信号を、追跡局で同時またはスイッチングにより計測する。ランダーの位置変化に対する原理的な感度は、想定される最も低い周波数である X 帯を用いた場合でも 0.3mm であり、FWD や RARR 等の従来手法と比べて著しく高精度である。一方、通信において従来手法より大電力を要すること、通信機経路内の高精度の位相補償を要することが、現状では技術課題である。

Reference: [1] Kawano et al. (1999) J. Geod. Soc. Japan, 45, 181-203.

キーワード: 火星, 自転, 宇宙測地, 逆 VLBI

Keywords: Mars, rotation, space geodesy, inverse VLBI

PPS002-18

会場:103

時間:5月25日 15:00-15:15

全火星地震波伝播モデリング 予備的研究

Global seismic waveform modeling in the whole Mars - a preliminary study -

豊国 源知^{1*}, 竹中 博士², 石原 吉明³

Genti Toyokuni^{1*}, Hiroshi Takenaka², Yoshiaki Ishihara³

¹ 国立極地研究所, ² 九州大学大学院理学研究院, ³ 国立天文台水沢

¹NIPR, ²Kyushu Univ., ³NAOJ

我々はこれまでに得られている火星内部構造モデルを用いて、火星の全球地震波動伝播のモデリングを行った。現在進行している日本の火星探査計画 MELOS では火星表面への地震計設置やそのデータによる内部構造探査を検討しており(小林他, 2009, 遊・星・人; Kurita et al., 2009, JPGU Meeting)、今回開発したスキームはその際のツールとしての役割が期待される。

火星は過去に地球とよく似た環境を持っていたと考えられ、その内部構造推定は地球や太陽系の形成史を明らかにする手がかりとして、地球惑星科学における長年の関心事となっている。これまでに提案されている火星内部構造モデルは、火星隕石の化学組成や、慣性モーメント等の物理学的パラメータの観測結果に基づいたものである。例えば Sohl & Spohn (1997, JGR) は極慣性モーメントの値と隕石から推定される Fe/Si 比をそれぞれ最もよく満たす 2 つの 1 次元火星内部構造モデル(モデル A とモデル B)を発表した。

地震学的手法を用いれば、さらに直接的かつ高解像度での全火星内部構造推定が可能となる。現時点で火星地震の記録と考えられる唯一のものは、1976 年に着陸したバイキング 2 号によるデータで特に精度が良い 640 時間分の記録のうちの 1 例だけであるが(Anderson et al., 1977, JGR)、マーズ・グローバル・サーベイナーによる地形データの解析では火星表面に 8500 の断層が同定され、上限値として 1 年にマグニチュード 4 以上の地震が 572 個発生しているという予測がなされている(Knapmeyer et al., 2006, JGR)。MELOS 計画で高感度・広帯域な地震計が設置されれば充分に地震学的な内部構造推定が行える可能性がある。

地球での例を振り返ってみると、我々の地球内部構造についての理解は、良質なデータの蓄積とシミュレーション手法の発達がシーソーのように影響しあって発展してきたことがわかる。現在得られている火星内部構造モデルをもとに、火星の地震波伝播モデリングのためのスキームを準備することは、来るべき火星地震観測時代へ向けた理論面からのアプローチとして一定の意味を持つと思われる。

我々はこれまでモーメントテンソル点震源から励起され、現実的な全地球内部構造モデル中を伝播する地震波を精度と効率よくモデリングする手法の開発を行ってきた(例えば、Toyokuni et al., 2005, GRL; Toyokuni & Takenaka, 2006, EPS)。この手法は球座標系での 3 次元の地震波の支配方程式を、震源と観測点を含む地球の 2 次元断面について差分法で計算するものであり(球座標系 2.5 次元差分法)、断面のみに着目するため計算効率が良く、標準地球モデルを使った他手法との比較から精度も保証されている。今回は本手法を火星の地震波モデリングに応用した。地震学的な惑星内部構造推定の際には理論波形の繰り返し計算が必要であるため、計算効率の良さは本手法の大きなメリットである。発表では Sohl & Spohn (1997, JGR) の球対称構造モデル A・B の上に、現実的な火星地殻厚を乗せた非対称火星モデルによるシミュレーション結果等を紹介する。

キーワード: 火星, 地震学, 地震波伝搬, 理論波形, グローバルモデリング, 差分法

Keywords: Mars, seismology, seismic wave propagation, synthetic seismogram, global modeling, finite-difference method (FDM)

PPS002-19

会場:103

時間:5月25日 15:15-15:30

火星環境における広帯域地震計測の検討 Consideration of broadband seismic observation on Mars.

西川 泰弘^{1*}, 新谷 昌人¹, 栗田 敬¹, 堀 輝人¹, 小林 直樹², 白石 浩章², 野中 聰², 福田 航², 鹿熊 英昭³, 石原 靖⁴
yasuhiro nishikawa^{1*}, Akito Araya¹, Kei Kurita¹, Teruhito Hori¹, Naoki Kobayashi², Hiroaki Shiraishi², Nonaka Satoshi²,
Fukuda Wataru², Hideaki Kakuma³, Yasushi Ishihara⁴

¹ 東京大学地震研究所, ²ISAS/JAXA, ³ 中央大学, ⁴JAMSTEC

¹Earthquake Res. Inst., Univ. of Tokyo, ²ISAS/JAXA, ³Chuou Univ, ⁴JAMSTEC

火星表面は過去の探査によって高解像度の画像をはじめとした多くの情報が蓄積されている。しかし火星の内部に関しては平均密度、モーメントや重力データなどの間接的な情報しか存在せず、コアのサイズや密度に関しても不確定要素が多い。その一方で火星の内部が散逸的であるという報告もなされており (Bills et al 2006) これは従来の'小さな天体は冷たくなるのが早い'という考えとは合わない。このような問題点を解決するため、火星の地震観測は必要である。

JAXA の火星探査計画 MELOS では複数の着陸機による内部構造探査案が提案されており、これには火星に地震計を設置する案も含まれている。火星は地震学的には未知の天体であるため、また一度に多数の観測点を設置することが困難なため、地震計で得られる地下深部からの微弱な地震波から様々な情報を余すことなく引き出したい。このため、設置する地震計は広帯域でなければならない。さらに地震計は非常に高感度である必要がある。その場合、もし観測点が一点に限定された場合でも常時自由振動が計測でき、コアの大きさや状態などの内部構造をより正確に決定ができるという利点もある。

しかし広帯域地震観測は傾斜や温度変化などの外部環境の影響を受けやすい。そのため、対策を講じなければならぬ。

地震計設置環境問題の中でも表層風は重要でかつ火星特有の問題である。我々は JAXA にある惑星環境風洞実験装置を借りて低圧および高風速下での風洞試験を行い、風洞試験結果とシミュレーションの比較を行った。

文献 :

A.Khan and J.A.D.Connolly, Constraining the composition and thermal state of Mars from inversion of geophysical data, Journal of Geophysical Research, Vol. 133 E07003, 2008

C.F.Yoder et al., Fluid Core Size of Mars from Detection of the Solar Tide, Science ,Vol.300 299,2003

キーワード: 火震, 自由振動, 内部構造, コアサイズ

Keywords: Marsquake, free oscillations, inner structure, core size

PPS002-20

会場:103

時間:5月25日 15:30-15:45

火星地表における大気電気学 Atmospheric electricity on Mars surface

高橋 幸弘^{1*}, 清水 久芳², 石坂 圭吾³, 門倉 昭⁴
Yukihiro Takahashi^{1*}, Hisayoshi Shimizu², Keigo Ishisaka³, Akira Kadokura⁴

¹ 北海道大学 宇宙物理学専攻, ² 東京大学 地震研究所, ³ 富山県立大学, ⁴ 国立極地研究所

¹Hokkaido University, ²University of Tokyo, ³Toyama Prefectural University, ⁴National Institute of Polar Research

No measurement of atmospheric electric field and electromagnetic waves on the ground in Mars has been made, though it could dedicated not only to understanding of the electric current research but also to the meteorology. DC electric filed near surface is considered to play an important role in initiating dust devil. The electromagnetic wave measurement makes it possible to know the location and the quantitative strength of dust devils wind with few observation sites. Though only one observation site enables us to determine the discharging location, two or three sites improve the accuracy significantly. This measurement also contributes to the studies both on the crust and the upper atmosphere. We propose a very simple and promising instrumentation set for the DC and AC electromagnetic observation making use of MELOS lander.

キーワード: 火星, 地表, 大気電気, ダストデビル, 電磁波

Keywords: Mars, surface, atmospheric electricity, dust devil, electromagnetic wave

PPS002-21

会場:103

時間:5月25日 15:45-16:00

Ionospheric Seasonal Variation in Martian Equatorial Region Ionospheric Seasonal Variation in Martian Equatorial Region

Mingyuan Wang^{1*}, Takao Kobayashi¹, Jinsong Ping¹
Mingyuan Wang^{1*}, Takao Kobayashi¹, Jinsong Ping¹

¹Shanghai Astronomica Observatory, CAS

¹Shanghai Astronomica Observatory, CAS

Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS) is a multi-frequency, synthetic-aperture, orbital sounding radar onboard Mars Express which was launched into an elliptic orbit with an inclination of 86.35 deg on 25 Nov 2003. By analyzing the surface echoes of MARSIS, Safaeinili proposed a method to calibrate the ionospheric effect and estimate the total electron content (TEC), peak electron density and neutral atmosphere scale height near the ionospheric peak properly. Using this method to collect TEC of Martian ionosphere over one Martian year from MARSIS, we have found TEC of ionosphere in Martian Equatorial Region is seasonal changed, and the changing trend is correlated with the seasonal cycle of carbon dioxide. As we know, in the lower ionosphere, photoelectron ionization is significant and makes a contribution of 20~30% to the total ionization rate [Nier and McElroy, 1977]. Even though CO₂ is the major atmospheric constituent of Mars at low altitudes and CO₂⁺ ions are the primary ions produced below 100 km, O₂⁺ ions are dominant at low altitudes (<260 km) because most of the CO₂⁺ ions are broken down into O₂⁺ ions through a subsequent ion-neutral reaction (CO₂⁺ + O -> O₂⁺ + CO). In a word, CO₂ is vaporized from polar cap, then photo-ionized to be CO₂⁺, O₂⁺ etc. These charged particles are main ions of Martian ionosphere, and interact with solar wind directly. As solar wind flows past Mars, significant amounts of ions are taken away. It means that oxygen dissociated from CO₂ escape from Martian atmosphere. Based on MARSIS TEC data, the amplitude of TEC changing is about 10² per m² which affects the oxygen escape speed.

キーワード: Mars, TEC, Carbon Dioxide

Keywords: Mars, TEC, Carbon Dioxide

PPS002-22

会場:103

時間:5月25日 16:00-16:15

MHD simulations of the cold ion escape from the ionospheres of Mars and Venus MHD simulations of the cold ion escape from the ionospheres of Mars and Venus

寺田 直樹^{1*}, 田中 高史², 品川 裕之³
Naoki Terada^{1*}, Takashi Tanaka², Hiroyuki Shinagawa³

¹ 東北大学, ² 九州大学, ³ 情報通信研究機構
¹Tohoku University, ²Kyushu University, ³NICT

Ionospheric flow channels and escape of cold ions from the ionospheres of Mars and Venus are investigated using a comprehensive magnetohydrodynamic (MHD) model of the solar wind interaction with the ionospheres of Mars and Venus. The model successfully describes the structures, dynamics, and energetics of both the solar wind and the planetary ionosphere regions. The model shows a complex 3-D flow pattern of the ionospheric plasma, forming large-scale four vortex structures on the nightside and escape channels through the magnetotail region. We also compare our numerical results with recent observations of the Kelvin-Helmoltz wave-like signatures obtained by the magnetometer onboard Venus Express. We show the importance of the viscous process in forming a complex flow pattern in the ionosphere and subsequent escape channels.

キーワード: 太陽風相互作用, 火星, 金星

Keywords: Solar wind interaction, Mars, Venus

PPS002-P01

会場:コンベンションホール

時間:5月25日 16:15-18:45

火星大気大循環モデルを用いた火星大気中へのダスト巻き上げに関する研究 The study of the dust lifting into the Martian atmosphere using Mars general circulation model

門脇 正尚^{1*}, 高橋 正明¹
Masanao Kadokami^{1*}, Masaaki Takahashi¹

¹ 大気海洋研究所, 東大

¹AORI, Univ. of Tokyo

Airborne dust plays an important role in the Martian climate system. Aerosol particles absorb and scatter the solar flux, and therefore, atmospheric temperature is strongly affected by temporal and spatial distributions of dust. The latter is supplied from the ground, and especially strong dust lifting occurs during so-called dust storms. Depending on the size and duration of the storms, they can be divided into three types: local, regional and global (planet-encircling). Numerous observations show that dust storms are generated mainly in the southern hemisphere every Martian year, although not every dust storm develops into global one. Implementation of the dust cycle in general circulation models (GCM) is highly important for simulations of the Martian climate system. Many existing Martian GCMs employ the observational data in order to evaluate the seasonal dust distributions in the atmosphere. We developed a dust lifting scheme, and implemented it into the GCM. The scheme accounts for dust particles lifting if the near-surface wind exceeds a certain threshold, their transport by the local wind, and sedimentation. The scheme is interactive in the sense that the simulated dust distributions affect radiative calculations, and thus, provide the feedback to the atmospheric wind and temperature. The scheme currently undergoes an extensive validation and sensitivity tests.

The simulated vertical flux of dust particles on the surface is seen that strong dust lifting occurs near 30S, in a good agreement with observations. Some patterns like global dust storm are simulated. In case of the strong dust lifting, opacities go up more than 0.3 for infrared wavelength. The southern summers of opacities are good agreement with the observations comparatively. Otherwise the northern winter ones are much lower.

Keywords: Mars, dust storm, Mars general circulation model

PPS002-P02

会場:コンベンションホール

時間:5月25日 16:15-18:45

火星の極域層状堆積物から見る気候変動

Climate history on Mars as seen from the polar layered deposits

秋里 恭太郎¹, 岡野 章一^{1*}

Kyotaro Akisato¹, Shoichi Okano^{1*}

¹ 東北大理 惑星プラズマ大気研究センター

¹ Plan. Plas. Atm. Res. Cen., Tohoku Univ.

近年の火星探査により、火星の極冠に氷とダストからなる層状堆積物が発見された。その層状構造の周期性は日射量変動と関連性があることが指摘されている。日射量変動は、気候変動を引き起こす最も重要な要素であることは良く知られている。地球の場合、このような関連性は、地球のグリーンランドや南極のアイスコアでも確認され、古気候を研究する際に過去の気候変動の指標として用いられる。火星でも同様のことが行えれば、火星の過去の気候変動を調べることが可能となる。火星北極では、過去の北極夏至日射量変動と北極域の崖の撮像データから見られる層状堆積物の放射輝度の鉛直方向変動に強い相関があることが報告された [Laskar et al., 2002]。また、火星南極でも同様の手法による研究が行われ、火星南極の夏至日射量変動と南極層状堆積物 (SPLD) の層状構造との関連性が北極同様に指摘されている [諸井 2008]。しかし、この解析例は広大な南極冠の内の一点しか行われていない上、評価の客觀性に議論の余地が残る。そこで、本研究は火星南極に着目し、南極全域に渡る複数の地点について解析を行うことで、SPLD の層状構造と火星の日射量変動との関連性を検証し、火星の過去の気候を探ることを目的としている。

本研究では、Mars Reconnaissance Orbiter の High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) による光学画像と Mars Global Surveyor の Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) による高度データを用いた。光学画像データは、2006年~2009年に取得されたものを用い、高度データは1999年~2001年に作成された高度地図を用いた。

本研究では、取得された層状堆積物の輝度変動と過去の日射量変動を二つの手法を用いて比較した。一つ目は、崖の頂上部の氷は近年に堆積したものであるという仮定を置き、両変動の波形を合わせるものである。二つ目は、両変動の周期を時間周波数解析することで比較するものである。これらの解析の際には、SPLD の層状構造の周期性を南北両極の日射量変動と比較した。

画像データを精査し、SPLD の分布と南極域の地形との関係性を調べた結果、SPLD は緯度経度に依らずに高度が急変する領域に多く見られることが確認された。そこで、異なる緯度帯や経度にある SPLD を選抜し、それぞれの SPLD の層状構造と南北両極の日射量変動との比較を行った。その結果、SPLD の層状構造の周期性は南極の日射量変動を反映していると考えられた。これは、地球の気候変動とは大きく異なる点である。さらに、高度情報も含めて考慮することで、SPLD の堆積率を見積もった。その結果、過去 100 万年間の平均堆積率は 0.019~0.030 cm/year と見積もられた。これは、南極の先行研究である諸井 [2008] から得られた堆積率 0.022 cm/year と近い値である。また、異なる緯度帯にある SPLD の 10 万年ごとの堆積率も求め、堆積率の年代ごとの変化を導出した。堆積率の年代ごとの変化は、異なる緯度帯のものでも同様の傾向を示した。これは、極冠の成長が南極冠全域で一様に進んできたためであると考えられる。また、南極の堆積率に対して、北極の先行研究である Laskar et al., [2002] では 0.050 cm/year、Miljkovich and Head., [2005] では、0.060 cm/year と見積もられており、堆積率のオーダーが一致していることが明らかになった。また、南極での堆積率が北極に比べて小さい傾向であることから、現在の両極冠の厚さに堆積率が影響を与えてきた可能性が示唆された。

SPLD の層状構造は南極の日射量変動を反映していることや、SPLD の堆積率の年代変化は異なる緯度帯であっても同様の傾向を示したことから、SPLD が過去の火星の気候を知るために重要な指標であることが改めて確認された。今後、SPLD の堆積率と極冠の成長モデルとの比較を行うことで、より詳細に過去の気候を調べができると考えられる。更なる研究により、南北両極の堆積率の差が、両極の地形的や気象的な差異から気候に与えられる影響を明らかにするための手がかりとなることが期待される。

キーワード: 火星, 南極, 層状堆積物, 気候, 極域, 日射量

Keywords: Mars, South pole, layered deposits, climate, polar, insolation

PPS002-P03

会場:コンベンションホール

時間:5月25日 16:15-18:45

Equivalent-Pole-Reduction(EPR) 法による火星磁場のマッピング Mapping of Mars crustal magnetic field using Equivalent-Pole-Reduction method

加藤 江莉奈^{1*}, 渋谷 秀敏¹
ERINA KATO^{1*}, Hidetoshi Shibuya¹

¹ 熊本大学大学院自然科学研究科

¹Kumamoto University

現在の火星は、地球とは異なりグローバルな磁場は持っていない。しかし局地的に非常に強い地殻磁場を持っており、その強さは地球の地殻磁場よりもはるかに強い。火星の地殻磁場の起源についての議論を行うためには、詳細な磁場マップが必要である。

今回は、Toyoshima et al.(2008)が考案した Equivalent-Pole- Reduction(EPR) 法を用いて、火星磁場の復元を行った。この手法は客觀性を持つスキームであり、既に月において、異なる高度データからその地殻磁場を十分に再現している。使用するデータは 1996 年から 2006 年まで運用されていた Mars Global Surveyor の磁力計での観測データである。これまでの研究では全球のマッピングが主とされてきたが、本研究では細かく地域を選出した。選出した地域は過去の復元磁場から典型的な特徴を示した箇所で、太陽系最大の火山 Olympus Mons を含む Tharisi Bulge、火星最大の渓谷 Valles Marineris、火星最大級の大きさと深さを持つ Herras Planitia、最大の磁気異常の見られる Terra Cimmeria 及び Terra Sirenum などである。

EPR 法で復元した地殻磁場より定高度のマッピングを行い、各地域ごとに地形図と重ねることで、地形との比較を行った。その結果火星の磁場の起源の議論に関わる地形の特徴と地殻磁場との間の関係を、先行研究と比べて、より細かい範囲で見ることができた。

キーワード: 火星、地殻磁場、Equivalent-Pole-Reduction 法、マーズグローバルサーベイラー

Keywords: Mars, crustal magnetic field, Equivalent-Pole-Reduction method, Mars Global Surveyor

PPS002-P04

会場:コンベンションホール

時間:5月25日 16:15-18:45

津波数値解析と堆積学的手法による火星の古海洋とクレーター湖に関する研究 Numerical analysis of impact-induced tsunami and geological implications for paleo-ocean and paleo-crate lakes on Mars

飯嶋 耕崇^{1*}, 後藤 和久², 箕浦 幸治¹, 小松吾郎³, 今村文彦⁴

Yasutaka Iijima^{1*}, Kazuhisa Goto², Koji Minoura¹, Goro Komatsu³, Fumihiko Imamura⁴

¹ 東北大・理・地学, ² 千葉工業大学 惑星探査研究センター, ³ ダヌンツィオ大学, ⁴ 東北大・災害制御研究センター

¹Geo-Environmental Sci., Tohoku Univ., ²PERC, Chiba Institute of Technology, ³IRSPS, Univ. G.d'Annunzio, ⁴DCRC, Tohoku Univ.

火星にかつて海洋が存在した可能性は、1980年代から指摘されている（Brandenburg et al. 1987）。特に、古海岸線らしき地形はいくつか提唱されているが（Head et al. 1999），十分な地形・堆積学的証拠が見つかっておらず、議論が続いている。その一方で、クレーター湖が存在した可能性はかなり高かったと考えられており（Fassett et al. 2007），過去の一時期に水が豊富に存在した時期があったと考えられる。

古海洋やクレーター湖に隕石が衝突したとすれば、巨大津波が発生し、海岸・湖岸線に地形・堆積学的痕跡を残した可能性が考えられる。火星では、潮汐やテクトニックな作用が弱いため、巨大津波による痕跡が今も残存している可能性がある。そこで本研究では、火星の古海洋・古クレーター湖を対象として、隕石衝突による津波の数値計算を行い、海岸・湖岸付近での津波挙動について調べた。さらに、海岸・湖岸線付近の衛星画像を解析し、隕石衝突による津波の痕跡の有無について調べた。

本研究ではまず、隕石衝突による津波の挙動を、浅水理論に基づいた断面1次計算によって解析した。Matsui et al. (2002)によれば、隕石衝突による津波は3種類考えられる。本研究では、海岸・湖岸線周辺の地形に与える影響が大きいと考えられる、リムウェーブおよびクレーターへの海水流入・流出にともなう津波の2種類について、クレーターの直径と津波の規模との関係を調べた。その結果、クレーター直径と津波規模とが正比例関係にあること、重力の違いにより、火星における津波の規模のほうが地球より約1.5倍大きくなることなどが明らかになった。

次に、火星上の実クレーター地形を利用し、古クレーター湖を想定した平面2次元計算を行った。その結果、津波が湖岸線を超えて、クレーターのリムを越波する際に、地形・地質学的な痕跡が残される可能性があることがわかった。

PPS002-P05

会場:コンベンションホール

時間:5月25日 16:15-18:45

火星のCentral Elysium Planitiaで見られるコーン状地形について Rootless Cone? Pingo? or Mud Volcano? in Central Elysium Planitia, Mars

野口 里奈^{1*}, 栗田 敬¹
Rina Noguchi^{1*}, Kei Kurita¹

¹ 東京大学地震研究所

¹ERI, the University of Tokyo

Central Elysium Planitia (CEP) on Mars is famous for having very smooth vast plains, which seem to be composed of material emanated from Cerberus Fossae. The nature of this material has been in long-standing dispute. Here we can find very young aged (10 Ma or less) lava flows have been identified (Hartmann et al., 2000, Vaucher et al., 2009) while aqueous floods also have been identified to emanate from Cerberus Fossae (Burr et al., 2002). If most of landscape in this area are lava flow origin, then this young volcanism is distinct from those at Tharsis Montes in many points and we consider it should be a key to understand present-day thermal state of Mars. If they are mostly aqueous flood origin high temperature lava is not necessary, which suggests different thermal state in the present mantle. In this respect geological interpretation of CEP is critical but still in debate even though high resolution images have been available. In this presentation we present a new interpretation for the formation of distinct "double cone structure" along magmatic origin.

In CEP, pervasive existence of cone-like morphological features (CLF) have been revealed by high resolution images. Until now three different interpretations are proposed for the origin of CLF: rootless cone (Fagents et al., 2002), pingo (Page, 2006) and mud volcano (Kangi, 2007). Rootless cones are product of phreatomagmatic eruption, which are located on lava flows that have moved over a substrate containing ice/water at the surface or subsurface. Pingo is a periglacial morphology, which is formed by upthrust of underground ice. Mud volcano is formed by effusion of mud by over-pressurization. Since the first interpretation is consistent with lava flow origin and the latter two support aqueous flood origin, CLF is a key morphology.

Some of CLF are known to have peculiar morphology. They have double cone structure (Double Cone Feature, DCF). From outside to center there exist 4 concentric features. Inside caldera-like depression surrounded by low rise rim main cone stands. At the top of the cone vent-like depression exists. In side depression another small cone rises. At the top of this cone a small pit exists. We focus on this morphology and investigate its spatial distribution and measure morphological parameters such as diameters and height by using HiRISE high resolution images. As for the estimate of height footprint of MOLA is so sparse compared to the size of DCF (mostly less than 200 m) photoclinometry is adapted. As for the distribution DCF is preferentially clustered in the area closer to Cerberus Fossae than normal CLF (single cone like feature). This indicates multiple passage of hot lava flows by using the same route. This may give rise to successive eruptions and later event should be smaller in magnitude because of exhaustion of water. Double cone structure is thus consistent with rootless cone activity while it is difficult to form by pingo/mud volcano.

キーワード: 火星, 火成活動, コーン

Keywords: Mars, Magmatism, Central Elysium Planitia, rootless cone, magma/ice interaction

PPS002-P06

会場:コンベンションホール

時間:5月25日 16:15-18:45

傾斜/粗度データを用いた火星表面の高解像度解析

High resolution characterization of martian surface in terms of slope/roughness

樋口 澄人^{1*}, 栗田 敬¹

Sumito Higuchi^{1*}, Kei Kurita¹

¹ 東京大学地震研究所

¹Earthquake Research Institute

By recent observations by high resolution images about martian surface various types of the surface are known to be systematically correlated with latitude, which is called as latitude-dependent morphology. They are interpreted as products of climatic control which is induced by variation of the obliquity. The basic type is mantling of dust-ice mixture which has smoother surface than the original surface of mostly aeolian erosion control.

In this presentation we report high resolution estimates of surface roughness/slopes corresponding to various types of latitude-dependent morphology with intention to provide data for future rover exploration. The basic method is photoclinometry applied to HiRISE data to estimate m-scale roughness. Kirk et al(JGR 113,2008) have already conducted m-scal topographic mapping for the survey of Phoenix landing site. Our aim is to construct basic data base for roughness/slope statistics of m-scale of typical surface types. Since the coverage of HiRISE image is limited we measured roughness by MOC and THEMIS-VIS data at coarser length scales. We combined fine scale(m-length scale) roughness spectrum and coarse scale(10-20 m) spectrum to a consistent spectrum. In combination to conventional photoclinometry approach we used thermal infrared images to estimate roughness. Bandfield et al (Icarus 193,2008) reported thermal infrared response of the surface irradiated by insolation is controlled by local roughness and a possibility to estimate subpixel scale roughness. We followed this approach.

We selected several test fields where four different types of images(HiRISE,MOC,THEMIS-VIS and THEMIS-IR) are available on the same target. They are west of Scaparelli crater, Amazonis Planitia and Eastern part of Utopia Planitia.

PPS002-P07

会場:コンベンションホール

時間:5月25日 16:15-18:45

火星外気圏 DSMC モデルの開発

Development of the Martian upper thermosphere and exosphere DSMC model

寺田 香織^{1*}, 藤原 均¹, 陣 英克², 寺田 直樹¹

Kaori Terada^{1*}, Hitoshi Fujiwara¹, Hidekatsu Jin², Naoki Terada¹

¹ 東北大学大学院理学研究科, ² 情報通信研究機構

¹Dept. Geophys., Tohoku Univ., ²NICT

我々は、DSMC (Direct Simulation Monte Carlo) 法による火星熱圏上部・外気圏の 3 次元モデルの開発を行っている。従来の外気圏のモデリングでは、Chamberlain モデルが用いられてきた。Chamberlain モデルは、クヌーセン数 (κ / H) ~ 1 となる exobase における速度分布関数を境界条件として、exobase 上空では無衝突、exobase におけるパラメータは一様、外圏は球対称であるとする仮定の下で、Liouville の定理に基づいて外気圏の密度を計算する。しかし、現実には exobase の上空約百 km は遷移領域であり、気体分子間の衝突を無視できない。また、exobase における大気の密度・温度は非一様であり、分子間の衝突が少ない外気圏中では exobase での直接の影響が遠方にまで伝達するため、後の 2 つの仮定も正しくない。

DSMC 法は、流体として扱える程衝突頻度が高くないが、気体分子間の衝突を無視することもできないような希薄気体 ($0.01 < Kn < 10$) の解法として発展してきた、実際の気体を支配する物理法則に従ったサンプル粒子を用いる粒子シミュレーションである。得られる解は、格子幅 $\Delta x \ll 0$ 、 $\Delta t \ll 0$ 、サンプル粒子数 $N \gg 1$ の極限において Boltzmann 方程式の解に収束する。また、Boltzmann 方程式の直接的解法が苦手とする多原子分子気体や化学反応も容易に組み込むことが可能である。

我々は流体近似が破れる $Kn > 0.01$ の領域、すなわち熱圏の上部と外気圏を thermal な成分を含めて DSMC 法で解くモデルの開発を行っている。近年、hot oxygen コロナを DSMC 法で解くモデルが開発されているが、主な衝突相手である thermal な成分も含めての DSMC モデルは、その膨大な計算コストが課題となり開発されていない。本発表では、初期結果を紹介する。